

РУКОВОДСТВО  
къ  
АРИΘΜΕΤΙΚЪ,  
для употребленія  
въ уѣздныхъ училищахъ  
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

изданное  
ДЕПАРТАМЕНТОМЪ НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

---

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

въ типографіи ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1830.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

## ОТДѢЛЕНІЕ III.

### *О дробяхъ.*

- ГЛАВА 1. Предварительныя объясненія. § 61—76.  
—— 2. Сложеніе простыхъ дробей. § 77—81.  
—— 3. Вычитаніе..... § 82—85.  
—— 4. Умноженіе..... § 86—90.  
—— 5. Дѣленіе ..... § 91—95.  
—— 6. Десятичныя дроби и че-  
тыре дѣйствія оныхъ... § 96—102.  
—— 7. Обращеніе простыхъ дробей  
въ десятичныя и обратно. § 103—105.  
—— 8. Периодическія десятичныя  
дроби..... § 106 и 107.  
—— 9. Непрерывныя дроби..... § 108 и 109.

## ОТДѢЛЕНІЕ IV.

### *Объ отношеніяхъ и пропорціяхъ.*

- ГЛАВА 1. Объ отношеніяхъ..... § 110—118.  
—— 2. О пропорціяхъ..... § 119—130.

## ОТДѢЛЕНІЕ V.

### О тройныхъ правилахъ.

- ГЛАВА 1. Простое тройное правило. § 131—134.  
—— 2. Сложное тройное правило. § 135—137.  
—— 3. Правила поварищесива и  
смѣшенія ..... § 138 и 139.  
Заключеніе ..... § 140.

*Прибавленіе 1.* О возвышеніи во вопро-  
ру и пренью степени и  
извлеченіи корней пѣхъ же  
степеней ..... § 141—150.

*Прибавленіе 2.* Таблицы иноспран-  
ныхъ монешъ, мѣрь и вѣ-  
совъ, спран. 182.



## ОТДѢЛЕНІЕ III.

### О ДРОВЯХЪ.

#### ГЛАВА I.

##### Предварительныя объясненія.

##### § 61. Происхожденіе дробей.

Выше (§ 36) было замѣчено, что не всегда одно число дѣлится на другое безъ остатка; на прим., если 13 раздѣлить на 2; то въ частномъ получится 6, и 1 въ остаткѣ. Частное болѣе 6, потому что  $6 \times 2$ , только 12; а менѣе 7, ибо  $7 \times 2$  равно 14, что болѣе дѣлимаго: и такъ искомое частное должно заключаться между 6 и 7, то есть, равно 6 единицамъ и еще части единицы. Чтобы найти сію часть единицы, должно оставшуюся отъ дѣлимаго единицу раздѣлить на двѣ равныя части, и взять одну такую часть.

*Прим. Ч. II.*



## § 62. Наименованіе частей единицы.

Если 1 единица раздѣлена будетъ на двѣ равныя части, то каждая называется *половиною*; если въ 1 единицѣ 3 равныя части, то каждая называется *третью*; если въ одной единицѣ 4 равныя части, то каждая называется *четвертью*, и такъ далѣе.

Каждая часть единицы получаетъ свое наименованіе отъ числа *частей*, которыя должны быть въ цѣлой единицѣ.

## § 63. Сравненіе частей.

Чѣмъ болѣе частей въ одной и той же единицѣ, тѣмъ части должны быть мѣльче или меньше; и такъ

1 половина	должна быть болѣе	1 шрепи
1 шрепи	. . . . .	1 чешвер.
1 чешверпи	. . . . .	1 пяшой.

и такъ далѣе

и обратно: 1 десятая должна быть менѣе 1 седьмой; пошому что въ одной и той же единицѣ первыхъ частей должно быть 10, а вторыхъ только 7.

## § 64. Опредѣленіе дроби.

Одна или совокупленіе нѣсколькихъ равныхъ частей единицы называется *дробью*. Для точнаго представленія какой нибудь дроби

должно знать какъ велики доли, и сколько ихъ находится въ оной.

Первое, по естъ величину частей узнаемъ, когда извѣстно будетъ сколько шаковыхъ частей въ единицѣ, и число, сіе показывающее, именуется *знаменателемъ*; второе же число, означающее сколько частей находится въ дробѣ, *числителемъ*. Оба сіи числа называются членами данной дроби. При выговариваніи дроби сперва произносится числитель, а потомъ знаменатель.

### § 65. Двойное разсматриваніе дроби.

Каждую дробь, на прим., при четверти, можно разсматривать двойнымъ образомъ: во первыхъ, какъ совокупленіе трехъ частей единицы, раздѣленной на четыре равныя части; ибо, если единица будетъ раздѣлена на четыре части, то каждая часть будетъ четверть, а при шаковыхъ частяхъ сопоставить данную дробь при четверти. Во вторыхъ, дробь при четверти можно разсматривать какъ частное число, происшедшее отъ дѣленія числителя 3 на знаменателя 4; ибо, если раздѣлить единицу на 4 равныя доли, то получатся 1 четверть; слѣд. если раздѣлить 3 единицы на четыре равныя части, то получится въ три раза болѣе, ш. е., при четверти.

### § 66. Изображеніе дробей цифрами.

На послѣднемъ объясненіи происхожденія дробей основано изображеніе оныхъ цифрами. Поелику дробь есть частное число, происходящее отъ дѣленія числителя на знаменателя; посему для изображенія оной пишется сперва числитель, потомъ проводится черта, означающая дѣйствіе дѣленія, и подъ оною подписывается знаменатель. На прим., дробь четыре девятихъ происходитъ отъ дѣленія четырехъ единицъ на 9 равныхъ частей, и посему должна быть изображена слѣдующимъ образомъ:  $\frac{4}{9}$ .

### § 67. Раздѣленіе дробей на правильныя и неправильныя.

Выше было сказано, что если единица будетъ раздѣлена на двѣ равныя части, то каждая часть называется половиною; изъ сего слѣдуетъ, что въ единицѣ 2 половины, и посему она можетъ быть изображена въ видѣ дроби:  $\frac{2}{2}$ . Она можетъ быть также изображена и въ видѣ слѣдующихъ дробей:  $\frac{3}{3}$ ,  $\frac{4}{4}$  и  $\frac{10}{10}$  и проч., ибо въ ней заключается 3 шреши, 4 четверши, или 10 десятыхъ и проч. Во всѣхъ дробяхъ, о копорыхъ прежде было говорено, числитель былъ менѣе знаменателя; въ дробяхъ, равныхъ единицѣ, числитель равенъ



знаменателю; теперь рассмотрим дробь, въ которой числитель болѣе знаменателя, на прим.  $\frac{7}{4}$ .

Въ сей дроби знаменатель 4 означаетъ четвертая доли единицы, а числитель 7 показываетъ, что оныхъ должно взять 7, для составленія дроби; но какъ въ единицѣ четвертой только четыре, то изъ того слѣдуетъ, что дробь  $\frac{7}{4}$  болѣе единицы. Изъ всего выше сказаннаго явствуетъ, что дробь можетъ быть менѣе, равна, и болѣе единицы; въ первомъ случаѣ она называется *правильною*, а въ двухъ послѣднихъ *неправильною*. И такъ *правильная дробь есть такая дробь, въ которой числитель менѣе знаменателя, а неправильная есть такая дробь, въ которой числитель равенъ или болѣе знаменателя.*

#### § 68. *Исключеніе цѣлаго числа изъ неправильной дроби.*

Поелику неправильная дробь болѣе единицы; то рассмотримъ какимъ образомъ можно опредѣлить, сколько единицъ въ оной заключается. Положимъ что требуется узнать сколько единицъ содержится въ дроби  $\frac{12}{4}$ . Въ единицѣ заключается 4 четверти; и такъ чтобы узнать сколько единицъ въ 12 четвертяхъ, надлежитъ найти, сколько разъ 4 четверти

содержатся въ 12 четвертяхъ; для сего надобно 12 раздѣлить на 4, и частное число 3, будетъ искомое, т. е. въ  $\frac{12}{4}$ , 3 единицы.

Рѣшимъ еще одинъ примѣръ. Положимъ, что требуется узнать сколько единицъ въ неправильной дроби  $\frac{15}{4}$ . Въ сей дроби единица содержится столько разъ, сколько 4 четверти заключаются въ 15 четвертяхъ, т. е., 3 раза, и еще 3 четверти остаются въ остаткѣ; и такъ въ данной неправильной дроби  $3\frac{3}{4}$  единицы.

Изъ сего слѣдуетъ, что для нахождения, сколько единицъ заключается въ данной неправильной дроби, или, какъ обыкновенно выражаются, чтобъ исключить цѣлое число изъ неправильной дроби, надлежитъ числителя раздѣлить на знаменателя, и частное число будетъ искомое. Если же при семъ будетъ остатокъ, то оный прибавляютъ къ частному, подписавъ знаменателя.

### § 69. Обращеніе смѣшаннаго и цѣлаго чиселъ въ неправильныя дроби.

Займемся теперь обратнымъ дѣйствіемъ, т. е., обращеніемъ цѣлаго числа, или цѣлаго числа съ дробью (смѣшаннаго числа) въ неправильную дробь. Положимъ что требуется обратить  $5\frac{1}{4}$  въ неправильную дробь. Прежде



всего должно 5 цѣлыхъ изобразить также въ четверныхъ доляхъ: въ 1 единицѣ 4 четверти; слѣд. въ 5 единицахъ должно быть  $5 \times 4$ , или 20 четвертей; прибавивъ еще оставшуюся  $\frac{1}{4}$ , получимъ искомую неправильную дробь 21 четверть, ш. е.,  $\frac{21}{4}$ .

Изъ сего слѣдуетъ, что для обращенія цѣлаго числа въ дробь въ неправильную дробь надлежитъ цѣлое число умножить на знаменателя дроби, къ полученному произведенію прибавить числителя, и подъ суммою подписать знаменателя.

Изобразимъ теперь какое нибудь цѣлое число, на прим. 5, въ видѣ дроби. Положимъ, что пребудетъ выразить оную въ четверныхъ. Въ 1 единицѣ 4 четверти, слѣд. въ 5 единицахъ должно заключаться  $5 \times 4$  или 20 четвертей, или  $\frac{20}{4}$ .

Изъ сего слѣдуетъ, что для обращенія цѣлаго числа въ неправильную дробь надлежитъ только данное число умножить на произвольное число; произведеніе будетъ числителемъ, а множитель знаменателемъ искомой дроби.

### § 70. О измѣненіи величины дробей.

Теперь слѣдуетъ разсмотрѣть какія перемѣны происходятъ въ величинѣ дробей, при

увеличиваніи и уменьшеніи ихъ числителей и знаменателей.

I. Если умножимъ только числителя какой нибудь дроби, на прим:  $\frac{9}{11}$ , на какое нибудь число 3; то данная дробь обратится въ дробь  $\frac{27}{11}$ , которая должна быть болѣе, ибо въ ней 9 такихъ же частей, какихъ въ данной 3. Сверхъ сего, поелику въ полученной дроби втрое болѣе частей, то она должна быть въ 3 раза болѣе данной, т. е., во столько разъ болѣе, сколько единицъ во множителѣ. И такъ если числитель какой нибудь дроби будетъ умноженъ на какое нибудь число, а знаменатель останется тотъ же, то дробь увеличится и увеличится во столько разъ, сколько единицъ во множителѣ.

II. Если умножимъ только знаменателя какой нибудь дроби, на пр.  $\frac{4}{7}$ , на произвольное число 4; то данная дробь обратится въ дробь  $\frac{4}{28}$ , которая должна быть менѣе данной; ибо частей въ оной столько же, сколько и въ данной; части же менѣе, потому что оныхъ заключается въ единицѣ 28, между тѣмъ въ такой же единицѣ частей данной дроби только 7 (§ 63). Изъ сего же явствуетъ что части новой дроби въ 4 раза менѣе, ибо оныхъ въ той же самой единицѣ въ 4 раза болѣе. И такъ если знаменатель какой

нибудь дроби будетъ умноженъ, а числитель останется тотъ же, то дробь уменьшится, и уменьшится во столько разъ, сколько единицъ во множителѣ.

III. Если раздѣлимъ числители данной дроби  $\frac{1}{16}$  на произвольное число 4, то она обратится въ дробь  $\frac{2}{16}$ , которая будетъ менѣе данной; ибо въ ней заключаеяся только 2 пакихъ же частей, какихъ въ данной дроби 8; и поелику 2 части менѣе 8 паковыхъ же частей въ 4 раза, посему и данная дробь уменьшилася въ 4 раза, т. е., во столько разъ, сколько единицъ въ дѣлителѣ. И такъ если числитель какойнибудь дроби будетъ раздѣленъ, а знаменатель останется тотъ же, то дробь уменьшится во столько разъ, сколько единицъ въ дѣлителѣ.

IV. Если знаменатель какойнибудь дроби  $\frac{1}{15}$  будетъ раздѣленъ на произвольное число, на пр. 5, то изъ данной дроби получится дробь  $\frac{1}{3}$ , которая должна быть болѣе; ибо въ оной столько же частей какъ и въ данной, но части болѣе (крупнѣе), пошому что оныхъ менѣе заключаеяся въ той же единицѣ. Поелику паковыхъ частей въ той же единицѣ въ 5 разъ менѣе, нежели частей данной дроби; то и части новой дроби должны быть болѣе частей данной дроби въ



5 разъ; а изъ сего слѣдуешь, что и самая дробь сдѣлалась въ 5 разъ болѣе, т. е., во столько разъ болѣе, сколько единицъ въ дѣлителѣ. И такъ если знаменатель какой нибудь дроби будетъ раздѣленъ, а числитель останется тотъ же, то дробь увеличится, и увеличится во столько разъ, сколько единицъ въ дѣлителѣ.

§. 71. О перемѣнѣ вида дробей, не измѣняя величины оныхъ.

Изъ предъидущаго § явствуешь:

I. Если числитель и знаменатель какой нибудь дроби будутъ умножены на одно и то же произвольное число, то дробь хотя измѣнится въ видѣ, но сохранитъ прежнюю свою величину; ибо во сколько разъ она увеличилась отъ умноженія числителя (§ 70. I) во столько же разъ уменьшилась отъ умноженія знаменателя на то же число (§ 70. II). Положимъ что данной дроби  $\frac{2}{5}$  числитель и знаменатель умножась на 5, тогда она обратится въ дробь  $\frac{10}{25}$ . Въ сей дроби въ пятеро болѣе частей, но части или доли, въ какихъ она выражается, въ пять разъ менѣе; а изъ сего слѣдуешь, что ея величина не измѣнилась.

II. Если числитель и знаменатель какой нибудь дроби будутъ раздѣлены на одно и

тоже произвольное число, то дробь также сохранитъ свою величину, хотя измѣнится по виду; ибо во сколько разъ она уменьшилась отъ дѣленія числителя (§ 70. III.), во столько же разъ увеличится отъ дѣленія знаменателя на тоже число (§ 70. IV.).

Раздѣлимъ числитель и знаменатель какойнибудь дроби  $\frac{12}{9}$  на 9, то данная дробь обратится въ дробь  $\frac{2}{3}$ . Во второй дроби въ 9 разъ менѣе долей, но она въдесятеро болѣе долей первой дроби; изъ сего слѣдуетъ, что данная дробь  $\frac{12}{9}$  должно быть равна  $\frac{2}{3}$ .

### § 72. Сокращеніе дробей.

Изъ вышесказаннаго слѣдствія предъидущаго параграфа явствуетъ, что всякая дробь можетъ быть изображена меньшими числами, или приведена въ простѣйшій видъ, если числитель и знаменатель имѣютъ общаго дѣлителя. На прим. дробь  $\frac{12}{9}$  можетъ быть приведена въ простѣйшій видъ, когда числитель и знаменатель раздѣлятся на общаго ихъ дѣлителя 3, и тогда она обратится въ слѣдующую дробь:  $\frac{2}{3}$ . Сію дробь можно привести еще въ простѣйшій видъ, раздѣливъ числитель и знаменатель на общаго дѣлителя 3; и тогда получится дробь  $\frac{2}{3}$ , которая не можетъ быть болѣе сокращаема, потому что 2 и 3 суть первыя числа. Таковое приведе-



нѣ дробей въ меньшій видѣ, не измѣняя ихъ величины, называется сокращеніемъ дробей.

Дѣйствіе сіе обыкновенно представляется въ слѣдующемъ видѣ.

$$\frac{\overset{3}{\cancel{12}}}{\overset{3}{\cancel{24}}} = \frac{3}{8} = \frac{3}{8}.$$

Другой примѣръ. Сократишь дробь:  $\frac{94}{128}$ .

$$\frac{\overset{4}{\cancel{94}}}{\overset{4}{\cancel{128}}} = \frac{19}{32} = \frac{2}{2} = \frac{1}{2}.$$

И такъ  $\frac{94}{128} = \frac{1}{2}$ .

### § 73. Признаки дѣлимости чиселъ на первыя девять чиселъ.

Такъ какъ въ послѣдствіи часто нужно будетъ находить дѣлителей чиселъ, то весьма полезно знать признаки, по которымъ безъ затрудненія можно видѣть, дѣлятся ли данныя числа на первыя 9 чиселъ.

I. Всякое число, на прим. 146, дѣлится на два безъ остатка, если на мѣстѣ единицъ находится четное число; ибо въ такомъ случаѣ данное число состоитъ изъ нѣсколькихъ десятковъ, и четнаго числа единицъ. 2 единицы содержатся въ 1 десяткѣ 5 разъ; слѣд. и во всякомъ числѣ десятковъ должны заключаться безъ остатка; въ четномъ числѣ единицъ также заключается безъ остатка; а посему и во всемъ числѣ.

II. Всякое число дѣлится безъ ошпшка на 3, если сумма всѣхъ цифръ, оное изображающихъ, дѣлится на 3.

Всякое число десяпковъ, пысячь и ш. д., можетъ быть раздѣлено на 3, шакъ что ошпшокъ будетъ равняпсья самому числу десяпковъ, сошенъ, пысячь и ш. д.; на прим., если 1 дес. раздѣлится на 3, шо въ частномъ будетъ 3, а въ ошпшкѣ 1; если 2 десяпка раздѣлится на 3, шо въ частномъ получишся 6, а въ ошпшкѣ 2; если 3 десяпка раздѣлится на 3, шо въ частномъ будетъ 10, или 9, и въ шакомъ случаѣ въ ошпшкѣ будетъ 3.

Такимъ же образомъ можно раздѣлитъ каждое число сошенъ, пысячь, и шакъ далѣе. Для удобнѣйшаго обозрѣнiя прилагается слѣдующая таблица:

$$1 \text{ десяпокъ} = 3 \times 3 + 1.$$

$$2 \text{ —————} = 6 \times 3 + 2.$$

$$3 \text{ —————} = 9 \times 3 + 3.$$

$$4 \text{ —————} = 12 \times 3 + 4.$$

и шакъ далѣе.

$$1 \text{ сошпя} = 33 \times 3 + 1.$$

$$2 \text{ —————} = 66 \times 3 + 2.$$

$$3 \text{ —————} = 99 \times 3 + 3.$$

$$4 \text{ —————} = 132 \times 3 + 4.$$

и шакъ далѣе.

$$1 \text{ тысяча} = 333 \times 3 + 1.$$

$$2 \text{ —————} = 666 \times 3 + 2.$$

$$3 \text{ —————} = 999 \times 3 + 3.$$

$$4 \text{ —————} = 1332 \times 3 + 4.$$

Зная сіе легко можно увѣриться въ выше приведенномъ правилѣ, разсмотрѣвъ какой нибудь частный случай. Пусть будетъ 3252 данное число и потребуемся узнать дѣлится ли оно на 3. Для сего разложимъ число десянковъ, сотенъ, тысячъ и пр. д., на 2 числа, изъ коихъ бы одно дѣлилось на 3 безъ ошашка, а другое бы равно было самому числу десянковъ, сотенъ, тысячъ. И такъ:

$$3000 = 999 \times 3 + 3.$$

$$200 = 66 \times 3 + 2.$$

$$50 = 15 \times 3 + 5.$$

$$2 = \quad \quad + 2.$$

Изъ сего слѣдуетъ, что данное число 3252 состоишь изъ  $999 \times 3 + 66 \times 3 + 15 \times 3$  и ошашковъ 3, 2, 5, 2. Въ каждомъ изъ первыхъ трехъ чиселъ 3 содержишь цѣлое число разъ (§ 46); слѣд. и сумма оныхъ должна дѣлиться на 3 безъ ошашка. Далѣе, поелику и сумма ошашковъ дѣлится нацѣло на 3, то и все данное число должно дѣлиться на 3 безъ ошашка; но упомянутые ошашки выражающя тѣми же цифрами, какими и данное число; то изъ сего явствуетъ, что дѣлимось



даннаго числа на 3, зависить единственно отъ того, дѣлится ли сумма знаковъ оного на 3.

Въ семь примѣрѣ сумма цифръ,  $3+2+5+2$ , равная 12 дѣлится на 3; слѣд. и самое число дѣлится на 3; въ чемъ и можно увѣриться, раздѣливъ въ самомъ дѣлѣ:

$$\begin{array}{r|l}
 3252 & 3 \\
 \hline
 3 & 1084 \\
 \hline
 25 & \\
 24 & \\
 \hline
 12 & \\
 12 & \\
 \hline
 & 0
 \end{array}$$

III. Всякое число, большее сотни, дѣлится на 4, если послѣднія двѣ цифры, т. е., десятки съ единицами, дѣлится на 4; ибо въ такомъ случаѣ данное число состоитъ изъ одной или нѣсколькихъ сотенъ, тысячъ, и т. д., и еще десятковъ и единицъ. 4 Единицы содержатся въ 1 сотнѣ ровно 25 разъ, посему должны заключаться въ каждомъ числѣ сотенъ безъ остатка; въ десяткахъ же съ единицами 4 заключающагося безъ остатка по условію; посему на 4 должно дѣлиться и все число. На прим. 1464 дѣлится на 4, потому что 64 дѣлится на 4 безъ остатка.

IV. Всякое число дѣлится безъ остатка на 5, когда на мѣстѣ единицъ находится 0 или 5. Въ первомъ случаѣ данное число состоишь изъ однихъ только десятковъ; поелику же 1 дес. дѣлится на 5 безъ остатка, то и все данное число должно дѣлиться на 5. Во второмъ случаѣ данное число состоишь изъ десятковъ и 5 единицъ, и поелику каждая часть дѣлится на 5 безъ остатка, то и все число должно дѣлиться на 5 безъ остатка.

V. Всякое число дѣлится на 6, если дѣлится на 2 и на 3; потому что 2 раза 3, 6. И пакъ всякое четное число, въ коемъ сумма знаковъ дѣлится на 3, дѣлится на 6 безъ остатка. На прим. число 4278 дѣлится на 6, потому что оно четное и сумма цифръ (21) дѣлится на 3.

VI. Всякое число большее 1000 дѣлится безъ остатка на 8, когда часть онаго, изображающаяся послѣдними тремя знаками, дѣлится на 8; ибо въ такомъ случаѣ данное число состоишь изъ одной или нѣсколькихъ тысячъ, и еще сотенъ, десятковъ и единицъ; 8 единицъ заключаются въ 1000 точно 125 разъ, посему должны содержаться въ каждомъ числѣ тысячъ безъ остатка; въ сотняхъ же, десяткахъ и единицахъ, по самому усло-



вію, содержатся безъ остатка; а изъ сего слѣдуетъ, что и все такое число дѣлится на 8 безъ остатка. По сему правилу 145, 480 должно дѣлиться на 8, потому что 480 дѣлится на 8 безъ остатка.

VII. Всякое число дѣлится безъ остатка на 9, если сумма всѣхъ цифръ, оное изображающихъ, дѣлится на 9 безъ остатка. Сіе правило доказывается точно такъ, какъ правило дѣлимости чиселъ на 3. И такъ 1341 дѣлится на 9; ибо  $1+3+4+1=9$ , а 9 дѣлится на 9 безъ остатка.

#### § 74. Отѣискиваніе общаго большаго дѣлителя.

Въ предъидущемъ §. были показаны признаки, по которымъ можно узнать, дѣлится ли числитель и знаменатель данныхъ дробей на первыя 9 чиселъ (исключая 7). Но сихъ правилъ недостаточно, ибо нѣкоторые числа, хотя не дѣлится на первыя 9 чиселъ, но могутъ дѣлиться на большія числа. На пр. дробь  $\frac{13}{17}$  можетъ быть сокращена на 17; раздѣливъ оба члена дроби (§ 71.) на сіе число, получится вмѣсто оной  $\frac{1}{3}$ . Изъ сего слѣдуетъ, что для сокращенія дробей нужно знать общій способъ находить общаго дѣлителя двухъ чиселъ.

Пусть будутъ данныя числа 169 и 533.

Очевидно, что общій большій дѣлиТЕЛЬ не можетъ бытьъ болѣе меньшаго числа 169; 169 дѣлился само на себя безъ остатка; слѣд. если сіе число дѣлится другое число 533 безъ остатка, то оно должно быть не только общимъ, но и общимъ большимъ дѣлителемъ.

Раздѣливъ 533 на 169:

$$\begin{array}{r|l} 533 & 169 \\ 507 & 3 \\ \hline & 26 \end{array}$$

получимъ въ частномъ 3 и въ остаткѣ 26. И такъ 169 не будетъ общимъ дѣлителемъ, ибо 533 не дѣлится на оное число безъ остатка; слѣд. общій большій дѣлиТЕЛЬ долженъ быть менѣе 169.

Выше было объяснено (§ 36), что дѣлиТЕЛЬ, умноженный на частное и сложенный съ остаткомъ, составляетъ дѣлимое, т. е.,

$$533 = 169 \times 3 + 26.$$

И такъ искомое число должно быть общимъ большимъ дѣлителемъ 169 и  $169 \times 3 + 26$ .

Но если какое нибудь число дѣлится 169 безъ остатка, то оно должно и 169 взятое 3 раза раздѣлиться безъ остатка (§ 46); если

же сіе число не раздѣлишь 26 безъ остана-  
ка, то оное не раздѣлишь и числа 169 взя-  
таго 3 раза, сложеннаго съ 26, а посему и не-  
будешь общимъ дѣлителемъ 169 и  $169 \times 3 + 26$ ;  
и такъ общіе дѣлители 169 и 533 должны  
быть также общими дѣлителями 169 и 26,  
а посему и *общій большій* дѣлитель 169  
и 533 долженъ быть также *общимъ боль-  
шимъ* дѣлителемъ 169 и 26. *Общій большій*  
дѣлитель 169 и 26 не можетъ быть болѣе  
меньшаго числа 26. 26 дѣлится само на себя,  
надлежитъ только узнать дѣлится ли 169  
на 26.

$$\begin{array}{r} 169 \overline{) 26} \\ 156 \overline{) 6} \\ \hline 13 \end{array}$$

Раздѣливъ 169 на 26 получимъ въ частномъ  
6, и въ остаткѣ 13; и такъ 26 не будетъ  
общимъ дѣлителемъ 169 и 26, слѣд. и данныхъ  
двухъ чиселъ 533 и 169.

Изъ предъидущаго (§ 36) явствуетъ, что  
дѣлимое число  $169 = 26 \times 6 + 13$ . И такъ  
искомый общій дѣлитель 169 и 26, долженъ  
также быть общимъ дѣлителемъ 26 и  $26 \times 6 + 13$ .  
Но если какое нибудь число дѣлится 26,  
то оное должно дѣлиться также и 26 взя-  
тое 6 разъ; если же сіе число не раздѣлишь  
13 безъ остана, то оное не раздѣлишь



также и  $26 \times 6 + 13$ , слѣд. и не будетъ общимъ дѣлителемъ 26 и  $26 \times 6 + 13$  (или 169); и такъ общія дѣлители 26 и 169 должны быть общими дѣлителями 26 и 13; а посему и *общій большій дѣлитель* 169 и 533 долженъ быть также *общимъ дѣлителемъ* 26 и 13.

Общій большій дѣлитель 26 и 13 не можетъ быть болѣе 13. 13 дѣлится само на себя безъ остатка; и такъ остается только узнать дѣлится ли 26 на 13.

$$\begin{array}{r|l} 26 & 13 \\ 26 & 2 \end{array}$$

”

Изъ послѣдняго дѣленія видимъ, что 26 дѣлится на 13 безъ остатка; и такъ 13 есть *общій и высшій общій большій дѣлитель* 26 и 13.

Выше было выведено:

1. *Общій большій дѣлитель* 533 и 169 долженъ быть *общимъ большимъ дѣлителемъ* 169 и 26.

2. *Общій большій дѣлитель* 169 и 26 долженъ быть *общимъ большимъ дѣлителемъ* 26 и 13. Но *общій большій дѣлитель* 26 и 13 есть 13; слѣд. 13 есть *общій большій дѣлитель* данныхъ чиселъ.

Соединивъ всѣ сдѣланныя дѣленія, сіе дѣйствіе представится въ слѣдующемъ видѣ.

$$\begin{array}{r}
 533 \overline{) 169} \\
 \underline{507} \phantom{0} \\
 26
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 26 \overline{) 13} \\
 \underline{26} \\
 0
 \end{array}$$

”

$$\begin{array}{r}
 169 \overline{) 26} \\
 \underline{156} \phantom{0} \\
 13
 \end{array}$$

Сіе самое дѣйствіе можетъ быть еще сокращено слѣдующимъ образомъ:

$$\begin{array}{r}
 533 \overline{) 169} \\
 \underline{507} \phantom{0} \\
 169 \overline{) 26} \\
 \underline{156} \phantom{0} \\
 26 \overline{) 13} \\
 \underline{26} \\
 0
 \end{array}$$

”

Разрѣшивъ подобнымъ образомъ еще нѣсколько другихъ задачъ сего рода, можно вывести изъ оныхъ слѣдующее правило:

чтобъ найти общаго большаго дѣлителя двухъ данныхъ чиселъ, должно сперва раздѣлить большее число на меньшее, потомъ меньшее на первый остатокъ, потомъ первый остатокъ на второй и т. д., пока не будетъ дѣленія безъ остатка; то послѣдній дѣлитель долженъ

быть общимъ большимъ дѣлителемъ данныхъ двухъ чиселъ.

§ 75.- Раздробленіе именованныхъ дробныхъ чиселъ.

Въ § 72 было объяснено, что всякое дробное ошвлеченное число можетъ быть представлено въ различныхъ видахъ, ш. е., выражено въ меньшихъ и большихъ доляхъ, на прим. дробь  $\frac{8}{3} = \frac{12}{12}$ , и таже равна  $\frac{2}{3}$ . Разсмотримъ, не можно ли подобной перемѣны сдѣлать и съ дробнымъ именованнымъ числомъ. Положимъ что требуется узнать сколько сажень въ  $\frac{4}{15}$  версты.

Въ § 65 было объяснено, что дробь  $\frac{4}{15}$  можно разсмапривать какъ пятнадцатую часть 4 единицъ; слѣд. чтобы узнать сколько сажень въ  $\frac{4}{15}$  версты, надлежитъ сперва узнать сколько сажень въ 4 верстахъ, и потомъ раздѣлить на 15.

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 4 \text{ верст.} \\
 500 \\
 \hline
 2000 \text{ саж.} \\
 15 \\
 \hline
 50 \\
 45 \\
 \hline
 50 \\
 45 \\
 \hline
 5
 \end{array}
 &
 \begin{array}{r}
 15 \\
 \hline
 133 \frac{1}{3} \text{ саж.}
 \end{array}
 \end{array}$$

слѣд. въ  $\frac{4}{15}$  версты 133  $\frac{1}{3}$  саж.



Изъ сего примѣра явствуетъ, что для приведенія дробнаго именованнаго числа въ число меньшаго наименованія, надлежитъ только числителя умножить на знаменательное число, и происшедшее произведение раздѣлить на знаменателя; найденное частное будетъ искомое число.

### § 76. Превращеніе дробныхъ именованныхъ чиселъ.

Разсмотримъ еще превращеніе дробныхъ именованныхъ чиселъ.

Положимъ что требуется превратить  $\frac{2}{3}$  минуты въ часть часа, или узнать какую часть часа составляютъ  $\frac{2}{3}$  одной минуты.

Поскольку часъ болѣе минуты въ 60 разъ, то искомая часть часа, равняющаяся  $\frac{2}{3}$  минуты, должна быть въ 60 разъ менѣе  $\frac{2}{3}$ ; и такъ искомое число будетъ  $\frac{2}{5 \times 60}$  (§ 70)  $= \frac{2}{300} = \frac{1}{150}$  часа.

Изъ сего слѣдуетъ, что для превращенія дробныхъ именованныхъ чиселъ надлежитъ только знаменателя умножить на знаменательное число.

## ГЛАВА II.

## СЛОЖЕНІЕ ПРОСТЫХЪ ДРОБЕЙ.

## § 77. Сложеніе дробей съ одинаковыми знаменателями.

Узнавъ важнѣйшія свойства дробей, можно приступить къ различнымъ родамъ вычислений съ оными. Начнемъ со сложения.

При сложении дробей могутъ быть два случая: во 1<sup>ю</sup>, дроби могутъ имѣть одинаковыхъ знаменателей, и во 2<sup>ю</sup> разныхъ знаменателей.

I. Сложеніе дробей съ одинаковыми знаменателями весьма просто.

Положимъ, что требуется сложить дроби  $\frac{4}{9}$  и  $\frac{3}{9}$ ; поелику обѣ дроби выражены въ одинаковыхъ доляхъ, т. е., въ девятыхъ, то надлежитъ только число долей первой дроби сложить съ числомъ долей второй, и получится 7 девятыхъ ( $\frac{7}{9}$ ). И такъ для сложения дробей, имѣющихъ одинаковыхъ знаменателей должно сложить числители данныхъ дробей, и подъ суммою подписать того же знаменателя (для показанія изъ какихъ частей составлены дроби).

II. Если же дроби будутъ имѣть разныхъ знаменателей, то не можно поступать по вышеприведенному правилу, потому что дроби выражены въ разныхъ доляхъ. На прим., дроби  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{3}$  не соспавяшъ ни  $\frac{2}{3}$  ни  $\frac{2}{2}$ . И такъ должно сперва выразишь обѣ дроби въ одинакихъ доляхъ.

### § 78. Приведеніе дробей къ одинакому знаменателю.

Поелику дроби въ такомъ случаѣ выражены въ одинакихъ доляхъ, когда имѣютъ одинакихъ знаменателей (§ 69), то и надлежитъ даннымъ дробямъ, если пребудетъ изобразишь оныя въ одинакихъ доляхъ, дать такой видъ, чтобы онѣ имѣли одного и того же знаменателя. Дѣйсвіе сіе называется *приведеніемъ дробей къ одному знаменателю*.

Положимъ, что пребудетъ привесть дроби  $\frac{3}{4}$  и  $\frac{2}{3}$ , къ одному знаменателю.

Если оба члена первой дроби, т. е.,  $\frac{3}{4}$  будутъ умножены на знаменателя второй, то величина оной не измѣнится (§ 71.), и знаменатель полученной дроби  $\frac{15}{12}$  будетъ равенъ произведенію изъ обоихъ частныхъ знаменателей. Также если оба члена второй дроби умножатся на знаменателя первой, то величина оной не измѣнится, знаменатель же



полученной дроби  $\frac{2}{30}$  будетъ также равенъ произведенію изъ обоихъ знаменателей; слѣд. такимъ образомъ полученные дроби должны имѣть одинакихъ знаменателей, ибо (§ 28) произведеніе оспается тоже, въ какомъ бы порядкѣ множили взяты ни были, и при этомъ онѣ равны даннымъ дробямъ. И такъ, чтобъ привести двѣ дроби къ одному знаменателю, надлежитъ числителя и знаменателя каждой дроби умножить на знаменателя другой дроби.

Чтобы привести три дроби, или болѣе, къ одному знаменателю, должно, согласно съ выведеннымъ правиломъ, оба члена каждой дроби умножить на знаменателей прочихъ дробей; ибо въ такомъ случаѣ величина данныхъ дробей не измѣнилась (§ 71), знаменатель же ихъ будетъ тотъ же, потому что равенъ произведенію изъ всѣхъ частныхъ знаменателей.

Приведемъ дроби  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{5}{6}$  къ одному знаменателю.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5 \times 6}{3 \times 5 \times 6} = \frac{60}{90}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3 \times 6}{5 \times 3 \times 6} = \frac{72}{90}$$

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3 \times 5}{6 \times 3 \times 5} = \frac{75}{90}$$

## § 79.

Узнавъ какимъ образомъ приводятся дроби съ разными знаменателями къ одному, безъ всякаго затрудненія можемъ складывать онныя. Пусть требуется сложить:  $\frac{1}{3}$  и  $\frac{1}{4}$ .

По приведеніи сихъ дроби къ одному знаменателю:

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$$

будетъ,  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$ ; но  $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ ;  
слѣд.  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ .

Другой примѣръ. Сложимъ  $\frac{1}{5} + \frac{3}{7} + \frac{2}{9}$ .

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 7 \times 9}{5 \times 7 \times 9} = \frac{63}{315}$$

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 5 \times 9}{7 \times 5 \times 9} = \frac{135}{315}$$

$$\frac{2}{9} = \frac{2 \times 5 \times 7}{9 \times 5 \times 7} = \frac{70}{315}$$

И такъ:  $\frac{1}{5} + \frac{3}{7} + \frac{2}{9} = \frac{63}{315} + \frac{135}{315} + \frac{70}{315} = \frac{268}{315}$ .

Изъ сихъ примѣровъ явствуетъ, что для сложенія дробей, имѣющихъ различныхъ знаменателей должно сперва привести оный къ одному, и потомъ поступать какъ при сложеніи дробей съ одинаковыми знаменателями.

Иногда при сложеніи дробей получается неправильная дробь, но въ такомъ случаѣ изъ оной исключается цѣлое число.

Примѣры:

$$\text{I. } \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3+1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\text{II. } \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3+3+1}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$

### § 80. Сложеніе смѣшанныхъ чиселъ.

Иногда требуется складывать цѣлыя числа съ дробями. Въ такихъ случаяхъ должно цѣлыя числа и дроби складывать отдѣльно; и если отъ сложенія дробей произойдетъ неправильная дробь, то исключивъ изъ нея цѣлое число, прибавивъ оное къ суммѣ цѣлыхъ чиселъ.

Примѣръ 1. Сложимъ  $3 \frac{1}{2} + 2 \frac{3}{2}$ .

$$3 \frac{1}{2} + 2 \frac{3}{2} = 5 \frac{4}{2}$$

Примѣръ 2. Сложимъ  $5 \frac{1}{3} + 7 \frac{2}{3}$ .

$$5 \frac{1}{3} + 7 \frac{2}{3} = 12 \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 12 \frac{1+2}{3} = 12 \frac{3}{3}$$



Примѣръ 3.  $3\frac{3}{4} + 7\frac{3}{4} + 6\frac{4}{8} = 16 + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{4}{8} =$   
 $16 + \frac{40}{80} + \frac{40}{80} + \frac{40}{80} = 16 + \frac{120}{80} = 16 +$   
 $2\frac{13}{80} = 18\frac{13}{80}.$

Прим. 4.  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \frac{7}{12} + \frac{11}{15} + \frac{2}{20} + \frac{13}{80} + \frac{13}{80}$   
 на основаніи § 71 будетъ:

$$\frac{32}{80} + \frac{40}{80} + \frac{45}{80} + \frac{48}{80} + \frac{60}{80} + \frac{35}{80} + \frac{44}{80} + \frac{27}{80} + \frac{48}{80} + \frac{13}{80} =$$

$$\frac{378}{80} = \frac{63}{10} = 6\frac{3}{10}$$

### § 81. Сложеніе дробныхъ именованныхъ чиселъ.

Если слагаемыя дробныя числа суть именованныя и одного наименованія, то съ оными поступають совершенно по правиламъ сложенія дробей. Положимъ что требуется сложить  $3\frac{3}{4}$  пуда и  $2\frac{1}{4}$  пуда. Сложимъ сперва цѣлыя числа: 3 пуда и 2 пуда, 5 пудъ; потомъ  $\frac{3}{4}$  и  $\frac{1}{4}$ , получимъ (§ 79)  $\frac{4}{4}$  пуда; слѣд. всего будетъ  $5\frac{4}{4}$  пудъ.

Если слагаемыя дробныя числа суть именованныя и разнаго наименованія, то надлежитъ сперва привести оныя въ числа одного наименованія, и потомъ поступать по тѣмъ же правиламъ. Сложимъ  $3\frac{1}{2}$  рубля,  $20\frac{1}{4}$  коп. Приведа  $3\frac{1}{2}$  рубля въ копейки, получимъ  $300 + \frac{200}{2}$  коп., или  $333\frac{1}{2}$  коп.; но  $333\frac{1}{2} + 20\frac{1}{4}$  коп.  $= 353$  коп.  $+ \frac{1}{2}$  коп.  $+ \frac{1}{4}$  коп.  $= 353\frac{3}{4}$  коп; слѣд. сіе число будетъ искомая сумма.

## ГЛАВА III.

## ВЫЧИТАНІЕ ПРОСТЫХЪ ДРОБЕЙ.

§ 82. *Вычитаніе дробей съ одинаковыми знаменателями.*

При вычитаніи дробей бываютъ также два случая, а именно: дроби могутъ имѣть одинаковыхъ и различныхъ знаменателей. Разсмотримъ первый случай.

Пусть пребудетъ вычесть  $\frac{3}{5}$  изъ  $\frac{5}{5}$ . Поелику въ вычитаемой дроби заключается 3 точно такихъ долей, какихъ въ уменьшаемой 5; то чтобы найти остатокъ, надлежитъ только 3 доли отнять отъ 5 долей, и останется 2 такихъ же долей, т. е., осьмихъ ( $\frac{2}{5}$ ).

И такъ, если требуется вычесть одну дробь изъ другой, имѣющей одинаковаго съ нею знаменателя, то должно вычесть числителя вычитаемой дроби изъ числителя уменьшаемой, и подъ остаткомъ подписать знаменателя (для показанія величины частей дроби).

Примѣры :  $\frac{8}{15} - \frac{2}{15} = \frac{6}{15}$   
 $\frac{17}{100} - \frac{3}{100} = \frac{14}{100}$

§ 83. *Вычитаніе дробей съ разными знаменателями.*

Если дроби имѣютъ разныхъ знаменателей, то не можно вычитаніе числителя вычитаемой дроби изъ числителя уменьшаемой, потому что доли, въ которыхъ оныя выражены, не одинаковы. На пр. если изъ  $\frac{2}{3}$  вычитается  $\frac{1}{4}$ , то не можетъ остаться ни  $\frac{1}{3}$  и ни  $\frac{1}{4}$ .

Изъ сего слѣдуетъ, что сперва должно привести ихъ къ одному знаменателю, и потомъ уже можно поступать какъ при вычитаніи дробей, имѣющихъ одинаковаго знаменателя; слѣд.

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}.$$

И такъ при вычитаніи дробей съ разными знаменателями должно сперва привести оныя къ одному, и потомъ поступать какъ при вычитаніи дробей, имѣющихъ одинаковыхъ знаменателей.

§ 84. *Вычитаніе цѣлыхъ чиселъ съ дробями.*

Если уменьшаемое и вычитаемое числа заключающъ въ себѣ цѣлыя числа съ дробями; то должно сперва вычесть дробь изъ дроби, а потомъ цѣлое число изъ цѣлаго.



Примѣръ 1. Изъ  $7\frac{2}{3}$  вычести  $1\frac{2}{3}$

$$7\frac{2}{3} - 1\frac{2}{3} = 6\frac{0}{3}$$

Примѣръ 2. Изъ  $7\frac{4}{5}$  вычести  $4\frac{3}{5}$ .

$$7\frac{4}{5} - 4\frac{3}{5} = 3\frac{1}{5}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$$

Примѣръ 3. Изъ 8 вычести  $4\frac{4}{7}$ .

Поскольку въ уменьшаемомъ числѣ нѣтъ дроби, то должно отъ 8 единицъ отнять единицу, и обратить оную въ дробь, имѣющую знаменателемъ (семь) число, равное знаменателю вычитаемой дроби, потомъ изъ оной вычести вычитаемую дробь, и наконецъ отъ цѣлаго числа, уменьшеннаго единицею отнять цѣлое число, находящееся въ вычитаемомъ.

$$8 - 4\frac{4}{7} = 7 + 1 - 4\frac{4}{7} = 7 + 7 - 4\frac{4}{7} = 3\frac{3}{7}$$

Примѣръ 4. Изъ  $7\frac{2}{3}$  вычести  $3\frac{2}{3}$ .

$$7\frac{2}{3} - 3\frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = \frac{0}{3} = \frac{0}{3}$$

Въ семъ примѣрѣ вычитаемая дробь болѣе уменьшаемой, и посему должно отъ уменьшаемаго числа занять одну единицу, и приведя оную также въ 36 доли, прибавить къ уменьшаемой дроби, и потомъ поступать по извѣстнымъ уже правиламъ.

$$\frac{36}{36} + \frac{2}{36} - \frac{27}{36} = \frac{11}{36} - \frac{27}{36} = \frac{17}{36}$$

$$\text{слѣд. } 7\frac{2}{3} - 3\frac{2}{3} = 3\frac{17}{36}$$

## § 85. Вычитаніе дробныхъ именованныхъ чиселъ.

Если уменьшаемое, и вычитаемое числа суть именованныя и одного наименованія; то съ оными поступають точно такъ, какъ при вычитаніи дробныхъ чиселъ.

Примѣръ. Опъ  $8\frac{1}{2}$  ведеръ опнять  $3\frac{3}{10}$  ведра.  
 $8\frac{1}{2}$  в. —  $3\frac{3}{10}$  в. =  $5\frac{1}{2}$  в. —  $\frac{3}{10}$  в. =  $5\frac{5}{10}$  в. —  $\frac{3}{10}$  в. =  $5\frac{2}{10}$  или  $5\frac{1}{5}$  ведрамъ.

Если уменьшаемое и вычитаемое числа суть именованныя, и разнаго наименованія, но принадлежащія къ одному роду; то надлежитъ сперва привести оныя къ одному наименованію, и потомъ поступать какъ въ предъидущемъ случаѣ.

Примѣръ. Опъ  $2\frac{2}{3}$  лоша опнять  $1\frac{1}{2}$  зол.  
 $2\frac{2}{3}$  лоша —  $1\frac{1}{2}$  золотн. = 2 лощ. 2 зол. —  $1\frac{1}{2}$  зол. = 2 лощ. и  $\frac{2}{3}$  золотника.

## ГЛАВА IV.

### Умноженіе простыхъ дробей.

При умноженіи дробей могутъ быть три случая: I. умноженіе дроби на цѣлое число; II. умноженіе цѣлаго числа на дробь, и III. умноженіе дроби на дробь.

Ариѳ. Ч. II.

## § 86. Умноженіе дроби на цѣлое число.

Пусть требуется умножить дробь  $\frac{3}{8}$  на цѣлое число 4. Умножить  $\frac{3}{8}$  на 4 значить: взять дробь  $\frac{3}{8}$  четыре раза, или увеличить ее въ 4 раза. Дробь же увеличивается въ 4 раза (§ 70. I), когда ея числитель умножится на 4. И такъ  $\frac{3}{8} \times 4 = \frac{3 \times 4}{8} = \frac{12}{8} = 1 \frac{4}{8} = 1 \frac{1}{2}$ .

Намъ извѣстно, что дробь еще (§ 70. IV) увеличивается, когда знаменатель ея раздѣлится; посему можно произвести упомянутое умноженіе дроби на 4, раздѣливъ ея знаменателя на 4; слѣд.  $\frac{3}{8} \times 4 = \frac{3}{8:4} = \frac{3}{2} = 1 \frac{1}{2}$ .

И такъ для умноженія дроби на цѣлое число должно: I. числителя умножить на множителя, и подѣ произведеніемъ подписать знаменателя данной дроби, или II. знаменателя раздѣлить на данного множителя, и найденное число сдѣлать знаменателемъ, оставивъ того же самого числителя.

**Примѣчаніе.** Второй способъ рѣшенія можно и долженъ быть употребляемъ только въ такихъ случаяхъ, когда знаменатель дѣлился на данного множителя безъ остатка.



### § 87. Умноженіе цѣлаго числа на дробь.

Умножимъ цѣлое число 5 на дробь  $\frac{2}{7}$ . Дробь  $\frac{2}{7}$  можно разсматривать какъ частное происшедшее отъ дѣленія 2 единицъ на 7 (§ 65); посему, если умножимъ 5 на  $\frac{2}{7}$ , то полученное произведеніе то будетъ въ 7 разъ болѣе настоящаго, попому что множителъ 2 болѣе даннаго множителя  $\frac{2}{7}$  въ 7 разъ; и такъ, чинобъ получить настоящее произведеніе, должно раздѣлить то на 7, слѣд. оное должно быть равно  $\frac{10}{7}$ .

А изъ сего слѣдуетъ, что для умноженія цѣлаго числа на дробь должно цѣлое число умножить на числителя, и произведеніе раздѣлить на знаменателя.

Сіе правило умноженія цѣлаго числа на дробь можно вывести еще слѣдующимъ образомъ: положимъ что пребудемъ умножить 5 на  $\frac{2}{7}$ . Умножимъ вообще значить (§ 26): взявъ множимое число, столько разъ, сколько во множителѣ заключается единицъ; и такъ умножимъ 5 на  $\frac{2}{7}$  значить: взявъ 5 столько разъ, сколько въ  $\frac{2}{7}$  заключается единицъ; но въ  $\frac{2}{7}$  не содержится ни одной единицы, посему число 5 не берется ни одного раза; и какъ въ дроби  $\frac{2}{7}$  содержится дважды взятая  $\frac{1}{7}$  доля единицы, то и слѣдуетъ взять только двѣ седьмыхъ

даннаго множимаго числа. Одна седьмая часть пяти единицъ будетъ равна  $\frac{5}{7}$  одной единицы; слѣд. двѣ седьмыхъ тогоже числа составяють вдвое большее число  $\frac{5 \times 2}{7}$  или  $\frac{10}{7}$ . Изъ сего рѣшенія выводится поже правило для умноженія цѣлаго числа на дробь, ш. е., должно цѣлое число раздѣлить на знаменателя, и частное умножить на числителя.

Примѣры:

$$7 \times \frac{1}{7} = \frac{7}{7} = 1 \frac{1}{7}$$

$$8 \times \frac{3}{7} = \frac{24}{7} = 3 \frac{3}{7}$$

$$18 \times \frac{7}{9} = \frac{126}{9} = 14.$$

Послѣднее умноженіе можно сдѣлать удобнѣйшимъ образомъ, припомнивъ, что получается одинъ и тотъ же выводъ (§ 43), въ какомъ бы порядкѣ дѣйствія умноженія и дѣленія ни были произведены. Чѣмъ умножить 18 на  $\frac{7}{9}$  должно 18 умножить на 7, и потомъ раздѣлить на 9; для облегченія же можно сперва раздѣлить 18 на 9, потомъ найденное частное 2 умножить на 7, и получится искомое произведеніе 14. Очевидно, что сей послѣдній способъ рѣшенія можетъ быть употребленъ только въ такомъ случаѣ, когда множимое число дѣлится на знаменателя множимея.

*Примѣчаніе.* При умноженіи цѣлаго числа на дробь, произведеніе всегда должно быть менѣе множимаго, если множителемъ будетъ правильная дробь; ибо въ такомъ случаѣ множимое не берется цѣлый разъ, но только часть онаго должна быть взята, и именно такая часть, какая означается дробнымъ множителемъ. На примѣръ, чтобы умножить 27 на  $\frac{2}{3}$ , должно взять онаго числа только  $\frac{2}{3}$ ; и изъ сего явствуетъ, почему произведеніе должно быть менѣе множимаго.  $\frac{2}{3}$  двадцати семи будетъ 9; слѣд.  $\frac{2}{3}$  даннаго числа равны 18; и такъ  $27 \times \frac{2}{3} = 18$ . Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что слово *умножить* не всегда значить *увеличить*.

### § 88. Умноженіе дроби на дробь.

Теперь слѣдуетъ показать правило умноженія дроби на дробь. Положимъ, что требуется найти произведеніе изъ  $\frac{2}{3}$  на  $\frac{3}{4}$ .

Сіе умноженіе можетъ быть также сдѣлано двоякимъ образомъ:

1. Чтобы найти произведеніе изъ  $\frac{2}{3}$  на  $\frac{3}{4}$ , умножимъ сперва  $\frac{2}{3}$  на 3. Происшедшее произведеніе  $\frac{2 \times 3}{3}$  должно быть болѣе настоящаго въ 4 раза, потому что множитель увеличенъ въ 4 раза (§ 44); и такъ, чтобы найти настоящее произведеніе, должно  $\frac{2 \times 3}{5}$  уменьшивъ



въ 4 раза; дробь же уменьшается, когда ея знаменатель будещъ умноженъ; слѣд. должно знаменателя 5 дроби  $\frac{2 \times 3}{5}$  умножить на 4, и получится искомое произведение  $\frac{2 \times 3}{5 \times 4} = \frac{2}{20}$ . Изъ сего слѣдуетъ, что для умноженія дроби на дробь надлежитъ произведение изъ числителей раздѣлить на произведение изъ знаменателей.

II. Умножимъ  $\frac{2}{3}$  на  $\frac{2}{5}$  значить: взявъ  $\frac{2}{3}$  ошъ  $\frac{2}{5}$ ; чѣмъбъ найши  $\frac{2}{3}$  ошъ  $\frac{2}{5}$  надобио дробь  $\frac{2}{3}$  уменьшивъ въ 4 раза; а чѣмъбъ уменьшивъ дробь въ 4 раза должно знаменателя 5 умножить на 4 (§ 70. II), и получится дробь  $\frac{2}{20}$ ; если четвертая часть двухъ пятыхъ равна  $\frac{2}{20}$ ; то при четверти  $\frac{2}{3}$  будуще въ 3 раза болѣе  $\frac{2}{20}$ , т. е.,  $\frac{2}{15}$ . Изъ сего рѣшенія можно вывести самое слѣдствие: для умноженія дроби на дробь надлежитъ произведение изъ числителей раздѣлить на произведение изъ знаменателей.

### § 89. Умноженіе цѣлыхъ и смѣшанныхъ чиселъ.

При умноженіи цѣлыхъ и смѣшанныхъ чиселъ могутъ быть три случая:

I. Умноженіе смѣшаннаго числа на цѣлое.

II. Умноженіе цѣлаго числа на смѣшанное.

III. Умноженіе смѣшаннаго на смѣшанное.

1<sup>ый</sup> Случай. Умножить смѣшанное число  $8\frac{1}{2}$  на цѣлое число 6. Чтобы умножить  $8\frac{1}{2}$  на 6, должно каждую часть онато, ш. е., цѣлое число 8 и дробь  $\frac{1}{2}$  умножить на 6, и тогда получимъ:  $8\frac{1}{2} \times 6 = 48 + \frac{1}{2} = 48 + 2\frac{1}{2} = 50\frac{1}{2}$ .

2<sup>ый</sup> Случай. Умножить цѣлое число 7 на смѣшанное число  $6\frac{1}{2}$ .

При семъ умноженіи должно поступать точно такъ какъ и въ первомъ случаѣ, ш. е., надлежитъ 7 умножить сперва на 6, потомъ на  $\frac{1}{2}$ :

$$7 \times 6\frac{1}{2} = 42 + \frac{1}{2} = 42 + 4\frac{1}{2} = 46\frac{1}{2}.$$

3<sup>ий</sup> Случай. Умножить смѣшанное число  $4\frac{1}{2}$  на смѣшанное же число  $2\frac{1}{2}$ .

Чтобы рѣшить сію задачу, надлежитъ только привести оба числа (§ 69) въ неправильныя дроби, и потомъ поступать какъ при умноженіи дроби на дробь (§ 88).

$$5\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} = \frac{11}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{11 \times 5}{2 \times 2} = \frac{55}{4} = 13\frac{3}{4}.$$

Чтобы умножить смѣшанное число на дробь, или обратно, должно смѣшанное число привести въ неправильную дробь, и потомъ поступать какъ въ § 88 показано.

### § 90. Умноженіе дробныхъ именованныхъ чиселъ.

Если множимое число именованное, то надлежитъ поступать точно такъ какъ при

умноженіи простыхъ дробныхъ чиселъ и умноженіи именованныхъ.

Примѣръ. Умножишь 8 десней  $4\frac{2}{3}$  лиспа на 5.

$$\begin{array}{r} 8 \text{ десн. } 4\frac{2}{3} \text{ лиспа} \\ \times 5 \\ \hline 40 \text{ — } 23\frac{2}{3} \text{ —} \end{array}$$

$$4\frac{2}{3} \text{ лисп. } \times 5 = 20\frac{2}{3} = 23\frac{2}{3} \text{ лиспамъ.}$$

$$8 \text{ десней } \times 5 = 40 \text{ деснямъ.}$$

Умноженіе именованныхъ чиселъ на простые дробныя числа, основано на тѣхъ же правилахъ. На примѣръ, умножишь 5 час. и 40 мин. на  $\frac{2}{5}$  значить: взявъ онаго числа двѣ пятыхъ; а чѣмъ получишь двѣ пятыхъ, надобно умножишь на 2, и потомъ раздѣлишь на 5. Дѣйствіе сіе представляется въ слѣдующемъ видѣ:

5 час. 40 мин.

2

$\begin{array}{r} 11 \text{ час. } 20 \text{ мин.} \\ \hline 10 \\ \hline 1 \\ \times 60 \\ \hline 60 \text{ мин.} \\ + 20 \\ \hline 80 \\ 5 \\ \hline 30 \\ 30 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 2 \text{ час. } 16 \text{ мин.} \end{array}$
--	--



Если множителъ смѣшанное число, то надлежитъ оное (§ 69) сперва обратить въ неправильную дробь, и потомъ поступать по предъидущему примѣру.

## ГЛАВА V.

### ДѢЛЕНІЕ ПРОСТЫХЪ ДРОВЕЙ.

При дѣленіи дробей могутъ быть также три случая: I. дѣленіе дроби на цѣлое число; II. дѣленіе цѣлаго числа на дробь; III. дѣленіе дроби на дробь.

#### § 91. Дѣленіе дроби на цѣлое число.

Раздѣлитъ дробь  $\frac{12}{25}$  на 6 значить: уменьшить ее въ 6 разъ; а чтобъ уменьшивъ дробь въ 6 разъ должно ея знаменателя умножить на 6, оставивъ того же числителя (§ 70. II.); и такъ искомое частное будетъ  $\frac{12}{25 \times 6} = \frac{12}{150} = \frac{2}{25}$ .

Дробь можетъ быть уменьшена еще другимъ образомъ, а именно раздѣливъ ея числителя на дѣлителя (§ 70. III.); въ такомъ случаѣ искомое частное будетъ  $\frac{12 : 6}{25} = \frac{2}{25}$ .

Изъ сего слѣдуетъ, что для дѣленія дроби на цѣлое число должно: I. умножить ея знаменателя на дѣлителя, оставивъ того же числителя, или II. раздѣлить, если можно, ея числителя, оставивъ того же знаменателя.

Примѣры:  $6: 8 = \frac{3}{4}$ ;  $\frac{48}{8}: 8 = \frac{6}{8}$ ;  $\frac{48}{12}: 12 = \frac{4}{12}$ .

### § 92. Дѣленіе цѣлаго числа на дробь.

Раздѣливъ цѣлое число 7 на дробь  $\frac{2}{3}$ .

Дѣленіе, какъ было объяснено въ § 37, есть такое дѣйствіе, посредствомъ котораго узнается, сколько разъ дѣлитель заключается въ дѣлимомъ. И такъ чѣмъ раздѣлимъ 7 на  $\frac{2}{3}$  должно найти, сколько разъ  $\frac{2}{3}$  содержится въ 7 единицахъ. Поскольку  $\frac{2}{3}$  содержится въ 1 единицѣ 5 разъ, а въ 7 единицахъ  $5 \times 7$  (35) разъ; но  $\frac{2}{3}$ , будучи вдвое болѣе  $\frac{1}{3}$ , должны заключаться въ 2 раза менѣе, ит. е.,  $\frac{5 \times 7}{2} = \frac{35}{2} = 17 \frac{1}{2}$  разъ.

Изъ сего примѣра можно вывести слѣдующее правило: при дѣленіи цѣлаго числа на дробь, должно цѣлое число умножить на знаменателя, и произведеніе раздѣлить на числителя.

Но въ § 43 было объяснено, что получается одинъ и тотъ же выводъ, въ какомъ бы порядкѣ дѣйствій произведены ни были, по-

сему при дѣленіи цѣлаго числа на дробь можно сперва раздѣлить оное на числителя, и потомъ частное умножить на знаменателя. Сей родъ рѣшенія удобнѣе въ томъ случаѣ, когда дѣлимое дѣлится на числителя.

Примѣръ. Раздѣлимъ 18 на  $\frac{2}{3} = \frac{18 \times 17}{6} = 3 \times 17 = 51$ .

Вышеприведенное правило для дѣленія цѣлаго числа на дробь, можно доказать еще слѣдующимъ образомъ: чѣмъ раздѣлимъ цѣлое число 7 на дробь  $\frac{2}{5}$ , раздѣлимъ 7 на числителя 2, и получимъ въ частномъ  $\frac{7}{2}$  (или  $3\frac{1}{2}$ ); но сіе частное должно быть менѣе настоящаго, потому что дѣлитель 2 болѣе настоящаго дѣлителя  $\frac{2}{5}$ ; и какъ 2 болѣе  $\frac{2}{5}$  въ 5 разъ, то и найденное частное  $\frac{7}{2}$  менѣе настоящаго въ 5 разъ; слѣд. искомое частное будетъ равно  $\frac{7}{2}$  умноженнымъ на 5, или  $\frac{7 \times 5}{2}$ .

И такъ, для дѣленія цѣлаго числа на дробь, должно цѣлое число умножить на знаменателя, и потомъ произведеніе раздѣлить на числителя.

### § 93. Дѣленіе дроби на дробь.

Чѣмъ раздѣлимъ какую нибудь дробь  $\frac{2}{3}$  на  $\frac{2}{5}$  должно также узнать, сколько разъ  $\frac{2}{5}$  содержится въ  $\frac{2}{3}$ . Поелику данныя дроби изоб-



ражены въ разныхъ частяхъ единицы, то не удобно ихъ сравнивать; и такъ надлежитъ сперва привести ихъ къ одному знаменателю. Сдѣлавъ сіе, дѣлимое будетъ  $\frac{16}{40}$ , а дѣлитель  $\frac{3}{8}$ ;  $\frac{3}{8}$  содержишься въ  $\frac{16}{40}$ , 16 разъ; посему дробь  $\frac{16}{40}$ , которая болѣе  $\frac{3}{8}$  въ 15 разъ, должна содержаться въ томъ же дѣлителемъ 15 разъ менѣе, т. е.,  $\frac{16}{120}$  или  $1\frac{1}{15}$  разъ. Дѣйствіе сіе представляется въ слѣдующемъ видѣ:

$$\frac{2}{5} : \frac{3}{8}$$

$$\frac{16}{40} : \frac{15}{40} = \frac{16}{120} = 1\frac{1}{15}.$$

Другое рѣшеніе. Чѣмъ раздѣлить  $\frac{2}{5}$  на  $\frac{3}{8}$ : раздѣлимъ сперва  $\frac{2}{5}$  на 3, и получимъ (§ 70. II)

$$\frac{2}{5 \times 3} \left( \frac{2}{15} \right); \text{ но сіе частное менѣе настоящаго,}$$

потому что принятый дѣлитель 3 болѣе настоящаго дѣлителя  $\frac{3}{8}$ ; и какъ 3 болѣе  $\frac{3}{8}$  въ 8 разъ, то и найденное частное менѣе настоящаго въ 8 разъ; и такъ чѣмъ найми сіе послѣднее, надлежитъ  $\frac{2}{5 \times 3}$  умножить на

$$8; \text{ слѣд. искомое частное равно (§ 70. I) } \frac{2 \times 8}{5 \times 3}$$

$$= \frac{16}{15} = 1\frac{1}{15}.$$

Изъ сихъ двухъ рѣшеній можно вывести слѣдующее правило: при дѣленіи дроби на дробь, должно произведение изъ числителя дѣлимой дроби и знаменателя дѣ-

лящей, раздѣлить на произведение изъ знаменателя дѣлимой и числителя дѣлящей.

Примѣры :

$$\frac{2}{3} : \frac{2}{7} = \frac{2 \times 7}{3 \times 2} = \frac{14}{6} = 1 \frac{2}{3}$$

$$\frac{7}{12} : \frac{4}{12} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$

#### § 94. Дѣленіе цѣлыхъ и смѣшанныхъ чиселъ.

Чтобъ раздѣлить смѣшанное число на цѣлое, или цѣлое на смѣшанное, надлежитъ смѣшанныя числа привести въ неправильныя дроби, и попомъ поступать по предъидущимъ параграфамъ.

Примѣры :

I.  $3\frac{1}{3} : 7 = \frac{10}{3} : 7 = \frac{10}{21}$  (§ 91.)

II.  $4\frac{1}{2} : 9 = \frac{9}{2} : 9 = \frac{1}{2}$  (§ 91.)

III.  $7 : 1\frac{1}{3} = 7 : \frac{4}{3} = \frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$  (§ 92.)

IV.  $9 : 1\frac{1}{2} = 9 : \frac{3}{2} = 3 \times 2 = 6$  (§ 92.)

V.  $7\frac{1}{2} : 1\frac{1}{7} = \frac{15}{2} : \frac{8}{7} = \frac{105}{16} = 6\frac{9}{16}$  (§ 93.)

VI.  $4\frac{1}{2} : 1\frac{1}{3} = \frac{9}{2} : \frac{4}{3} = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8}$  (§ 93.)

#### § 95. Дѣленіе именованныхъ чиселъ.

Чтобъ раздѣлить именованное число на простую дробь, надлежитъ (по § 91.) оное умножить на знаменателя, и происшедшее

отъ шого произведеніе раздѣлитъ на числи-  
теля.

Примѣръ. 40 саж. и 2 арш. раздѣлитъ на  $\frac{1}{2}$ .

40 саж. 2 арш.

$$\begin{array}{r}
 \times 7 \\
 \hline
 284 \text{ саж. } 2 \text{ арш. } \left| \begin{array}{l} 3 \\ \hline 94 \text{ саж. } 2\frac{1}{2} \text{ аршина.} \end{array} \right. \\
 \underline{27} \\
 14 \\
 \underline{12} \\
 2 \text{ саж.} \\
 \times 3 \\
 \hline
 6 \text{ арш.} \\
 \times 2 \\
 \hline
 8 \text{ арш.} \\
 \underline{6} \\
 2
 \end{array}$$

Если оба числа супъ дробныя и именова-  
ныя, то надлежитъ сперва привести ихъ въ  
числа одного наименованія, и потомъ посту-  
панъ какъ выше показано. На примѣръ, чѣмъ  
раздѣлитъ  $1\frac{1}{2}$  сажени на  $1\frac{1}{4}$  футовъ, должно  
сперва  $1\frac{1}{2}$  саж. привести въ футовъ. Умноживъ  
оное число на знаменательное число 7,  
найдемъ, что въ  $1\frac{1}{2}$  саж.  $10\frac{1}{2}$  футовъ. Раздѣливъ  
 $10\frac{1}{2}$  футовъ на  $1\frac{1}{4}$ , получимъ искомое частное  $8\frac{3}{4}$ .





## О ДЕСЯТИЧНЫХЪ ДРОБЯХЪ.

## ГЛАВА VI.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ОБЪЯСНЕНІЯ.

§ 96. *Опредѣленіе десятичныхъ дробей.*

Находишся еще особенный родъ дробей, копорыя имѣютъ знаменателемъ число 10, или степень изъ 10 (т. е., произведеніе, состоящее изъ двухъ или болѣе множителей, изъ коихъ каждый равенъ 10; на примѣръ,  $10 \times 10$  или сто,  $10 \times 10 \times 10$  или 1000, и проч.); и таковыя дроби называются десятичными. И такъ дроби  $\frac{2}{10}$ ,  $\frac{8}{100}$ ,  $\frac{127}{1000}$  суть десятичныя.

Очевидно, что оныя могутъ быть слагаемы, вычисляемы, умножаемы и дѣлимы точно такъ какъ простые дроби, потому что правила, нами найденныя, суть общія; но для десятичныхъ дробей можно вывести нѣкоторыя частныя правила, служащія для сокращенія и

облегченія всѣхъ дѣйствій. Сіи сокращенія и облегченія основаны на удобнѣйшемъ способѣ изображенія десятичныхъ дробей, и по сей причинѣ должны быть сперва изложены правила счисленія (нумераціи) оныхъ.

### § 97. Счисленіе десятичныхъ дробей.

I. Въ счисленіи цѣлыхъ чиселъ было объяснено, что значеніе каждой цифры въ 10 разъ менѣе значенія цифры, стоящей подлѣ оной по лѣвую сторону. На прим., въ числѣ *iii* первая цифра съ лѣвой стороны означаетъ 1 сотню, вторая 1 десятокъ, и *iii* д.

Поставимъ послѣ упомянушаго числа *iii* какой нибудь знакъ, на примѣръ запятую, и напишемъ еще нѣсколько цифръ:

*iii,iii.*

По принятому условію, значеніе первой цифры послѣ запятой должно быть въ 10 разъ менѣе единицы; слѣд. цифра *iii* означаетъ десятныя доли единицы. Вторая цифра, имѣющая еще въ десять разъ меньшее значеніе, должна означать десятныя доли одной десятой, или сотныя доли единицы, и *iii* д. И такъ вышенаписанныя цифры:

*iii,iii* означающъ 1 сотню, 1 десятокъ, 1 единицу, 1 десятую, 1 сотую и 1 тысячную. И какъ въ 1 десятой 100 тысячныхъ,

въ 1 сотой 10 тысячныхъ; то число, изображенное вышенаписанными знаками будетъ: 111 единиць и 111 тысячныхъ единицы.

Возмемъ еще одинъ примѣръ: 2,1045.

Цифра 2 означаетъ 2 единицы, цифра 1 одну десятую; цифра 4 четыре тысячныхъ; цифра 5 пять десятии тысячныхъ. Сложивъ дробь:

$$\frac{2}{10} + \frac{1}{1000} + \frac{4}{10000} = \frac{2000}{10000} + \frac{10}{10000} + \frac{4}{10000} = \frac{2045}{10000},$$

получимъ 1045 десятии тысячныхъ; слѣд. число, изображенное вышенаписанными знаками, будетъ: 2 единицы и 1045 десятии тысячныхъ.

Изъ сихъ примѣровъ явствуетъ:

I. Десятичныя дроби могутъ быть изображаемы безъ знаменателя, который подразумѣвается.

II. Величина долей, въ коихъ изображается десятичная дробь, зависитъ отъ числа цифръ. Если въ десятичной дроби одна цифра, то она изображена въ десятыхъ доляхъ; если двѣ, въ сотыхъ; если три, въ тысячныхъ и ш. д.

III. Цифры, стоящія по правую сторону запятой, отдѣляющей цѣлое число отъ дроби, составляютъ числителя десятичной дроби, а подразумѣваемый зна-



менатель состоитъ изъ 1, сопровождаемой столькою нулями, сколько находится цифръ въ числитель.

Таковы правила для выговариванія данныхъ десятичныхъ дробей, изображаемыхъ безъ знаменателя. Правила для изображенія десятичныхъ дробей безъ знаменателя основаны на тѣхъ же началахъ.

II. Положимъ, что требуется изобразить цѣлое число съ дробью, на прим.  $3\frac{23}{100}$ , безъ знаменателя. Поскольку данное число состоитъ изъ 3 единицъ, то надлежитъ сперва написать цифру 3, и подлѣ оной поставить запяную. Дробь  $\frac{23}{100}$  состоитъ изъ  $\frac{20}{100} + \frac{3}{100} = \frac{2}{10} + \frac{3}{100}$ . Изъ сего слѣдуешь, что послѣ запятой надлежитъ на первомъ мѣстѣ написать цифру 2, а на второмъ 3; слѣд. данное число изобразится такъ: 3, 23.

Примѣръ 2. Изобразить  $\frac{63}{1000}$  безъ знаменателя.

Поскольку въ данномъ числѣ единицъ не имѣется, то пишется 0 и подлѣ него ставится запяная. Дробь  $\frac{63}{1000} = \frac{60}{1000} + \frac{3}{1000} = \frac{6}{100} + \frac{3}{1000}$ . Поскольку въ данной дроби десятыхъ не заключается, то ставится 0 на первомъ мѣстѣ подлѣ запятой, потомъ цифра 6 на мѣстѣ сотыхъ, и 3 на мѣстѣ тысячныхъ. И такъ  $\frac{63}{1000} = 0,063$ .

Примѣръ 3. Изобразить  $\frac{3}{1000}$  безъ знаменателя.

Данная дробь  $\frac{3}{1000}$  не заключаетъ въ себѣ ни единицъ, ни десятокъ, ни сотъ, слѣд.  $\frac{3}{1000} = 0,003$ .

Изъ сихъ примѣровъ явствуетъ:

I. Въ десятичной дроби должно быть столько знаковъ, сколько заключается нулей въ знаменателѣ данной дроби.

II. Чтобъ написать данную десятичную дробь безъ знаменателя, надлежитъ только послѣ запятой написать числителя, если числитель изображается столькими же знаками, сколько находится нулей въ знаменателѣ.

III. Если же для изображенія числителя потребно менѣе знаковъ, нежели сколько находится нулей въ знаменателѣ, то слѣдуетъ послѣ запятой поставить столько нулей, чтобъ число оныхъ вмѣстѣ съ числомъ знаковъ числителя было равно числу нулей, находящихся въ знаменателѣ.

Изъ предъидущаго слѣдуетъ, что чрезъ прибавленіе одного или нѣсколькихъ нулей съ правой стороны къ десятичной дроби, перемѣняется только видъ оной, а величина остается

ся также; ибо во сколько разъ увеличится числитель, во столько же увеличится и подразумѣваемый знаменатель, на прим.  $3,207 = 3,2070 = 3,20700$ ; ибо  $3\frac{20700}{100000}$  (по сокращеніи на 10)  $= 3\frac{2070}{10000}$  (а по сокращеніи на 100)  $= 3\frac{207}{1000}$ .

### § 98. Объ измѣненіи величины десятичныхъ дробей.

Поелику значеніе десятичныхъ цифръ зависитъ отъ мѣста, ими занимаемаго, то съ переменною мѣста запятой, переменяется и величина всего числа: на примѣръ, если въ числѣ 4,27 переставить запятую и написать послѣ цифры 2, то вмѣсто 4,27 получится число 42,7, въ которомъ значеніе каждой цифры иное.

І. Если въ десятичной дроби, или цѣломъ числѣ съ десятичною дробью, на прим. въ 0,41 переставились запятая на одинъ знакъ вправо, то значеніе каждой цифры увеличилось въ 10 разъ. Въ данной дроби цифра 4 означаетъ десятые доли, а въ полученномъ числѣ (4,1) цифра 4 означаетъ единицы; слѣд. имѣетъ въ 10 разъ большее значеніе. Тоже самое можно сказать и о другой цифрѣ; а изъ сего слѣдуетъ, что и вся дробь увеличилась въ 10 разъ.

Если въ десятичной дроби, или цѣломъ числѣ съ десятичною дробью, на прим: въ



42,7256 запятая переставившись чрезъ 2 знака, то число увеличится во 100 разъ потому что значеніе каждой цифры увеличится во 100 разъ; и такъ  $4272,56 = 42,7256 \times 100$ .

Если запятая переставившаяся чрезъ 3 знака вправо, то число увеличится въ 1000 разъ и ш. д.

И такъ, чтобъ увеличить десятичную дробь, или цѣлое число съ десятичною дробью въ 10, 100, 1000 разъ, и ш. д., должно перенести запятую вправо на 1, 2, 3 знака и ш. д., т. е., на столько зна-ковъ, сколько во множителѣ находится нулей послѣ 1.

**Примѣчаніе.** Пусть будетъ 0,8 данная десятичная дробь. Если отбросимъ запятую, то произведемъ такую же переменную, какая происходитъ при перенесеніи оной на одинъ знакъ вправо, т. е., если поставимъ оную послѣ цифры 8, ибо въ такомъ случаѣ десятичныхъ знаковъ nebude; перенесеніемъ же запятой на одну цифру вправо, дробь увеличивается въ 10 разъ; слѣд. отбросивъ запятую въ данной дроби, увеличимъ оную въ 10 разъ.

Подобнымъ же образомъ можно объяснить, что если въ десятичной дроби 0,72 отбросимъ запятую, то она увеличится во 100 разъ.

Итакъ вообще, при отбрасываніи запятой, десятичная дробь увеличивается, и увеличивается соразмѣрно числу знаковъ въ дробѣ. Если въ оной находится 1 знакъ, то увеличивается въ 10 разъ, если 2 знака во 100 разъ и т. д.

II. До сихъ поръ мы переспанавливали запятую вправо; теперь разсмотримъ, какая перемѣна должна произойти отъ переспановленія оной влево. Пусть будетъ 0,217 данная десятичная дробь. Если переспавимъ запятую на одну цифру влево, т. е., поставимъ передъ 0; то значеніе каждой цифры уменьшится въ 10 разъ; а посему и самая дробь уменьшится въ 10 разъ.

Итакъ, чтобы уменьшить данную дробь въ 10 разъ, должно запятую переспавить на 1 знакъ влево, и написать передъ запятою 0, для означенія, что цѣлыхъ не находится; слѣд. дробь, въ 10 разъ меньшая данной, будетъ: 0,0217.

Если же въ какой нибудь десятичной дробѣ переспавить запятую влево чрезъ 2 знака, то она уменьшится во 100 разъ, потому что значеніе каждой цифры уменьшится во 100 разъ.

И такъ, чѣмъ уменьшишь десятичную дробь во 100 разъ, должно переставить запятую чрезъ 2 знака влѣво. Если въ данной дроби столько знаковъ не имѣется, то надлежитъ добавитъ нулями, сверхъ сего поставитъ еще 0 для означенія, что единицы не находится: на прим. если уменьшимъ 0,025 во 100 разъ, то получимъ 0,00025.

Если десятичная дробь соединена съ цѣлымъ числомъ, то происходитъ такая же перемѣна.

И такъ, чтобы уменьшить десятичную дробь, или цѣлое число съ десятичною дробью въ 10, 100, 1000, разъ, и т. д., должно переставить запятую влѣво на 1, 2, 3 и т. д. знаковъ, т. е., на столько знаковъ, сколько въ дѣлителѣ находится нулей.

Если въ данной дроби не имѣется столько знаковъ, то добавляется нулями, и потомъ ставится еще 0, для означенія, что цѣлаго числа не находится.

Чѣмъ уменьшишь цѣлое число въ 10, 100, 1000, разъ и т. д., надлежитъ только, основываясь на предъидущемъ, поставитъ запятую послѣ 1<sup>го</sup>, 2<sup>го</sup>, 3<sup>го</sup> знака и т. д.,



такомъ случаѣ значеніе каждой цифры, а по-  
сему и самое число уменьшился въ 10, 100,  
1000 разъ и т. д.

Примѣры:

$$14249 : 10 = 1424,9$$

$$14249 : 100 = 142,49$$

$$14249 : 1000 = 14,249$$

## ГЛАВА VI.

ЧЕТЫРЕ ДѢЙСТВІЯ ДЕСЯТИЧНЫХЪ ДРОБЕЙ.

### § 99. Сложеніе десятичныхъ дробей.

Чтобъ сложить нѣсколько десятичныхъ дро-  
бей, соединенныхъ съ цѣлыми числами, надле-  
житъ онѣя подписать одно подъ другимъ,  
какъ показано при сложеніи цѣлыхъ чиселъ,  
т. е., единицы подъ единицами, десятыя  
подъ десятыми, сотыя подъ сотыми и т. д.  
Пусть требуется сложить:  $4,37 + 0,2 +$   
 $5,81$ .

Подписавъ, какъ выше сказано:

$$\begin{array}{r} 4,37 \\ 0,2 \\ 5,81 \\ \hline 10,38 \end{array}$$

должно начать сложеніе съ единицъ наименьшаго разряда, въ семь примѣрѣ, съ сотыхъ. 7 сотыхъ и 1 сотая, 8 сотыхъ; пишу 8 подъ сотыми; 3 десятыихъ, 2 десят. и 8 десят. 13 десятиныхъ. Въ 13 десятиныхъ заключаеися 1 единица и еще 3 десятиныхъ; пишу 3 подъ десятиными, а 1 прикладываю къ единицамъ. 1 ед. и 4 ед., 5 единицъ, и еще 5 единицъ, 10 единицъ или 1 десятокъ; пишу 0 на мѣстѣ единицъ, а 1 на мѣстѣ десятковъ.

Примѣръ 2. Сложитъ  $42,012 + 3,07 + 807 + 0,2199$

$$\begin{array}{r}
 42,012 \\
 3,07 \\
 807 \\
 0,2199 \\
 \hline
 852,3019
 \end{array}$$

Изъ сихъ примѣровъ явствуетъ, что сложеніе десятичныхъ дробей производится совершенно по тѣмъ же правиламъ, какъ и сложеніе цѣлыхъ чиселъ.

#### § 100. Вычитаніе десятичныхъ дробей.

Чтобъ вычесть десятичную дробь изъ цѣловой же, или цѣлое число съ десятичною дробью изъ цѣловаго же числа, надлежитъ

сперва подписать вычитаемое число подъ уменьшаемымъ, такъ какъ показано въ предъидущемъ параграфѣ. Положимъ, что пребудемъ вычитать 7, 28 изъ 9, 45.

Подписавъ надлежащимъ образомъ:

$$\begin{array}{r} 9, 45 \\ 7, 28 \\ \hline 2, 17 \end{array}$$

должно начать вычитаніе съ единицъ наименьшаго разряда. 8 сотыхъ вычитать изъ 5 сотыхъ нельзя, занимаю одну десятую или 10 сотыхъ; прибавивъ 10 сотыхъ къ 5 сотымъ, получаю 15 сотыхъ; вычтя 8 сотыхъ изъ 15 сотыхъ, получу въ остаткѣ 7 сотыхъ; пишу 7 подъ сотыми. Изъ 3 десятыхъ вычитаю 2 десятыхъ, получаю въ остаткѣ 1 десятую, пишу 1 подъ десятыми; отнявъ 7 единицъ отъ 9 единицъ получу въ остаткѣ 2 единицы, пишу 2 подъ единицами; слѣд. весь остатокъ будетъ: 2, 17.

Иногда бываетъ въ уменьшаемомъ числѣ менѣе десятичныхъ знаковъ нежели въ вычитаемомъ; въ такомъ случаѣ, для удобства, прибавляешь (§ 97) столько нулей, чтобъ число десятичныхъ знаковъ было одинаково



въ обоихъ числахъ, и попомъ надлежитъ поступать какъ показано въ предъидущемъ параграфѣ.

Примѣръ 1. Изъ 17, 23 вычестъ 14, 3897.

$$\begin{array}{r} 17, 2300 \\ 14, 3897 \\ \hline 2, 8403 \end{array}$$

Примѣръ 2. Изъ 123 вычестъ 49, 8275.

$$\begin{array}{r} 123, 0000 \\ 49, 8275 \\ \hline 73, 1725 \end{array}$$

Изъ всего предъидущаго явствуетъ, что вычитаніе десятичныхъ дробей производится по тѣмъ же правиламъ, какъ и вычитаніе цѣлыхъ чиселъ.

### § 101. Умноженіе десятичныхъ дробей.

При умноженіи можно принять два случая: I. если десятичныя дроби находясь въ одномъ только множителѣ, и II. если оныя будутъ въ обоихъ множителяхъ.

**1<sup>ый</sup> Случай.** Умножимъ 0, 015 на 17.

Отбросивъ во множителѣ запятую, или принявъ оное за цѣлое число, умножимъ оное на 17.

( 60 )

$$\begin{array}{r} 15 \\ 17 \\ \hline 105 \\ 15 \\ \hline 255 \end{array}$$

Сіе произведеніе будетъ болѣе настоящаго въ 1000 разъ, поштому что принятое множимое въ 1000 разъ болѣе даннаго; и такъ, чшобъ получить настоящее, должно найденное произведеніе 255 уменьшитъ въ 1000 разъ; сіе же уменьшеніе произойдетъ (§ 98), если будучъ ошдѣлены запятою 3 десятичныхъ знака (именно столько, сколько оныхъ во множителѣ находишся), слѣд. искомое произведеніе будетъ 0,255. Сіе дѣйствіе представляется въ слѣдующемъ видѣ:

$$\begin{array}{r} 0,015 \\ 17 \\ 105 \\ 15 \\ \hline 0,255 \end{array}$$

Примѣръ 2. Умножитъ 215 на 0,09.

$$\begin{array}{r} 215 \\ 0,09 \\ \hline 19,35 \end{array}$$

Примѣръ 3. Умножить  $0,00012 \times 15$ .

$$\begin{array}{r}
 0,00012 \\
 \times 15 \\
 \hline
 60 \\
 12 \phantom{0} \\
 \hline
 0,00180 = 0,0018.
 \end{array}$$

Изъ всѣхъ сихъ примѣровъ можно вывести слѣдующее заключеніе: чтобъ умножить два числа, изъ коихъ одно заключаетъ въ себѣ десятичную дробь, должно оныя множить какъ цѣлыя числа, и въ происшедшемъ произведеніи отдѣлить отъ правой руки къ лѣвой столько десятичныхъ знаковъ, сколько оныхъ находится во множимомъ числѣ, или во множителѣ.

2<sup>ый</sup> Случай. Умножить  $0,025$  на  $0,17$ .

Принявъ оба числа за цѣлыя, и перемноживъ оныя получимъ:

$$\begin{array}{r}
 25 \\
 \times 17 \\
 \hline
 175 \\
 25 \phantom{0} \\
 \hline
 425
 \end{array}$$

Сіе произведеніе было бы болѣе искомаго въ 1000 разъ, еслибъ только множимое было принято за цѣлое число; но и множитель бо-



аѢ даннаго въ 100 разъ; слѣд. найденное произведение должно быть болѣе искомаго еще въ 100 разъ; слѣд., чшобъ получить настоящее произведение, надлежитъ найденное уменьшить въ 100000 разъ; сіе уменьшеніе произведемъ, поставивъ занятую чрезъ пять знаковъ вѣво именно чрезъ столько, сколько десятичныхъ знаковъ въ обоихъ множителяхъ находится; но какъ произведение выражено только тремя знаками, то должно прибавить два нуля (§ 98) потомъ поставить еще 0, для означенія, что цѣлыхъ не имѣется. И такъ искомое произведение будетъ: 0,00425.

*Примѣръ 2.* Умножить 7,25 на 0,22.

$$\begin{array}{r}
 7,25 \\
 0,22 \\
 \hline
 1450 \\
 1450 \\
 \hline
 1,5950 = 1,595.
 \end{array}$$

*Примѣръ 3.* Умножить 0,0024 на 0,016.

$$\begin{array}{r}
 0,0024 \\
 0,016 \\
 \hline
 144 \\
 24 \\
 \hline
 0,0000384
 \end{array}$$

Изъ сихъ примѣровъ можно заключить, что для умноженія двухъ чиселъ, въ коихъ заключаются десятичныя дроби, надлежитъ оныя числа принять за цѣлыя, потомъ умножать ихъ какъ цѣлыя числа, и наконецъ въ происшедшемъ произведеніи отъ правой руки къ лѣвой отдѣлить столько знаковъ для десятичной дроби, сколько находится десятичныхъ знаковъ въ обоихъ множителяхъ.

### § 102. Дѣленіе десятичныхъ дробей.

Дѣленіе десятичныхъ дробей можетъ быть также приведено къ дѣленію цѣлыхъ чиселъ. Положимъ, что пребудемъ раздѣлять 0,375 на 0,0025. Чтoby раздѣлить 0,375 на 0,0025, т. е., чтoby узнать, сколько разъ 0,0025 содержится въ 0,325, надлежитъ сіи дроби привести къ одному знаменателю. Для сего надобно только прибавить къ дѣлимой дроби 0 (§ 97); ибо въ такомъ случаѣ обѣ дроби будутъ выражены въ десятиныя доли.

И такъ,

$$0375 : 00025$$

$$\text{равно } 03750 : 00025.$$

Опбросивъ въ послѣднихъ числахъ, нули, т. е., что все равно, принявъ оныя за цѣлыя числа, увеличиваемъ дѣлимое и дѣлитель въ

одинакое число разъ, а именно въ 10,000 разъ; слѣд. чрезъ таковое измѣненіе (§ 45. III) частное не перемѣнится. И такъ дѣленіе данныхъ десятичныхъ дробей приведено къ слѣдующему дѣленію цѣлыхъ чиселъ:

$$\begin{array}{r|l} 3750 & 25 \\ 25 & 150 \\ \hline 125 & \\ 125 & \\ \hline \end{array}$$

слѣд. искомое частное будетъ 150.

Иногда дѣлитель бываетъ болѣе дѣлимаго, и въ такомъ случаѣ въ частномъ не можетъ быть цѣлаго числа.

Положимъ, что требуется раздѣлить 0,017 на 42. Приведемъ къ одному знаменателю и отбросивъ запятые, данное дѣленіе приводится къ слѣдующему:

$$17 : 42000 = \frac{17}{42000}$$

И такъ, чтобы раздѣлить десятичную дробь на десятичную, или цѣлое число съ десятичными дробями на таковое же, и проч., должно: I. Привести дѣлимое и дѣлителя къ одному знаменателю, прибавивъ къ десятичной дроби, въ которой менѣе знаковъ, столько нулей, сколько потребно, чтобы было равное число десятичныхъ знаковъ въ дѣлимомъ и дѣлителѣ.



II. Отбросивъ запятая, должно поступать точно такъ, какъ при дѣленіи цѣлыхъ чиселъ.

## ГЛАВА VII.

### ОБРАЩЕНІЕ ПРОСТЫХЪ ДРОБЕЙ ВЪ ДЕСЯТИЧНЫЯ И ОБРАТНО.

#### § 103. Обращеніе простыхъ дробей въ десятичныя.

Изъ предъидущихъ параграфовъ явствуетъ, что способъ изображенія десятичныхъ дробей и различныя вычисленія съ оными весьма удобны, и по сей причинѣ простыя дроби часто оными замѣняются; но чтобы можно было пользоваться симъ облегченіемъ, надлежитъ сперва умѣть обращать простыя дроби въ десятичныя.

Положимъ, что требуется обратить простую дробь  $\frac{3}{4}$  въ десятичную, т. е. найти, сколько въ оной заключается десятыхъ, сотыхъ, тысячныхъ долей единицы и т. д. Изъ § 65 явствуетъ, что дробь  $\frac{3}{4}$  можно рассматривать какъ частное, происшедшее отъ дѣленія 3 на 4. Поелику 3 менѣе 4, то въ частномъ не можемъ быть цѣлаго числа.

Ариф. Ч. II.

Чтобъ узнать, сколько въ частномъ заключается десятыихъ, приведемъ числителя 3 въ десятыя доли, коихъ будетъ 30; поелику же данная дробь  $\frac{3}{4}$  менѣе 3 въ 4 раза, то надлежитъ только 30 (десятыихъ) раздѣлить на 4, чтобъ найти, сколько содержится десятыихъ въ частномъ.

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 4} \\ 28 \phantom{0} \overline{) 7} \\ \hline 2 \end{array}$$

И такъ въ частномъ 7 десятыихъ и еще 2 десятыихъ въ остаткѣ. Если требуется опредѣлить частное еще точнѣе, т. е. въ сотыхъ доляхъ, то надлежитъ остатокъ 2 десятыихъ привести также въ сотыя, коихъ будетъ 20, и раздѣлить на 4. Раздѣливъ 20 на 4, получимъ въ частномъ 5. И такъ въ ономъ сверхъ 7 десятыихъ должно еще быть 5 сотыхъ; слѣд.  $\frac{3}{4} = 0,75$ .

Соединивъ всѣ сдѣланныя дѣленія, дѣйствіе сіе представимъ въ слѣдующемъ видѣ:

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 4} \\ 28 \phantom{0} \overline{) 0,75} \\ \hline 20 \\ 20 \\ \hline \end{array}$$

Примѣръ 2. Обратишь  $\frac{3}{109}$  въ десятичную дробь.

$$\begin{array}{r|l}
 3,00 & 109 \\
 218 & 0,027 \\
 \hline
 820 & \\
 763 & \\
 \hline
 57 &
 \end{array}$$

Поелику данная дробь  $\frac{3}{109}$  правильная, то въ часномъ не можетъ быть единицъ; также и десятичныхъ въ ономъ не заключаеся; ибо, если 30 десятичныхъ раздѣлить на 109, то не получится ни одной десятой, и посему должно поставить 0 на мѣстѣ единицъ и десятичныхъ. Приведа въ сотныя части получимъ 300 сотыхъ; раздѣливъ оныя на 109 найдемъ, что въ часномъ должно быть 2 сотыхъ, и ш. д.

Изъ сихъ примѣровъ выводится слѣдующее правило: I. *Чтобъ обратить простую дробь въ десятичную, надлежитъ числителя умножить на 10, и полученное произведение раздѣлить на знаменателя, поставивъ сперва 0 на мѣстѣ единицъ, если данная дробь правильная.*

II. *Если числитель, умноженный на 10 менѣе знаменателя, то ставится 0 на мѣстѣ десятичныхъ, и полученное произведение увеличивается еще въ 10 разъ; если происшедшее отъ того число не превосходитъ знаменателя, то пишется 0 на*



мѣстѣ сотыхъ, и сіе умноженіе продолжается до тѣхъ поръ, пока изъ числителя данной дроби составитъ число большее нежели знаменатель, и потомъ уже надлежитъ поступать совершенно по правиламъ дѣленія цѣлыхъ чиселъ.

Въ послѣднемъ примѣрѣ въ остаткѣ было 57. Сей остатокъ можно еще умножить на 10, и попомъ раздѣлить на 109, и тогда прибавится еще одинъ знакъ къ десятичной дроби. Легко усмотрѣшь, что дробь  $\frac{57}{109}$  не можешь имѣть точнаго частнаго; ибо всегда будешь остатокъ, потому что послѣдняя цифра дѣлителя 9 на какое бы число, меньшее 10-ти, ни было умножено, никогда не составишь произведенія, оканчивающагося нулемъ, который всегда бываешь послѣднимъ знакомъ дѣлимата: и такъ десятичныя дроби бываютъ конечныя и безконечныя.

Изъ сего слѣдуетъ, что не всегда можно получать десятичную дробь, которая была бы совершенно равна данной простой дроби; но она приближается тѣмъ болѣе къ данной, чѣмъ болѣе опредѣляется знаковъ.

Выше было найдено, что  $\frac{57}{109} = 0,027\ldots$ . Еслибъ мы остановились на второмъ знакѣ, т. е. на  $\frac{57}{109}$ , то разность между данною дробью и найденною десятичною была бы менѣ одной сотой; ибо

$\frac{3}{100}$  болѣе 0,02,  
а менѣе 0,03;

но разность между 0,02 и 0,03 равна 0,01 слѣд. разность между 0,02 и  $\frac{13}{100}$  менѣе 0,01;

Если же къ десятичной дроби будетъ прибавленъ еще одинъ знакъ, то разность между данною дробью и десятичною будетъ менѣе 0,001. И такъ разность между данною простую и происходящею опъ оной десятичною дробью нѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе знаковъ въ послѣдней.

#### § 104. Окончаніе дѣленія десятичныхъ дробей.

Выше было замѣчено (§ 102), что при дѣленіи десятичныхъ дробей, частное можетъ быть менѣе единицы, и въ такомъ случаѣ оное будетъ правильною дробью. Но чтобы при дѣленіи десятичныхъ дробей получить и частное въ видѣ десятичной дроби, надлежитъ по вышепоказанному правилу (§ 102) дѣлимое и дѣлителя привести къ одному знаменателю, принять оныя за цѣлыя числа, и потомъ поступать точно такъ какъ при обращеніи простой дроби въ десятичную (§ 103).

Примѣръ 1. Раздѣлитъ  $7,1 : 4,25$ .

$$7,1 : 4,25.$$

или  $7,10 : 4,25.$

$$\begin{array}{r} \text{или} \quad 710 \overline{) 425} \\ \underline{425} \phantom{0} \\ 2850 \\ \underline{2500} \\ 3500 \\ \underline{3400} \\ 100 \end{array}$$

или  $0,024:6,96$   
или  $0,024:6,960$   
или  $24:6960$

$$\begin{array}{r} 24,00 \overline{) 696} \\ 2088 \overline{) 0,0344} \\ \hline 3120 \\ 2784 \\ \hline 3360 \\ 2784 \\ \hline 576 \end{array}$$

§ 105. Обращение десятичныхъ дробей  
въ простыя.

Чтобъ привести конечную десятичную дробь въ простую, надлежитъ только подписать подразумѣваемого знаменателя, и потомъ сократить на общаго дѣлителя.



Примѣры:  $0,16 = \frac{16}{100} = \frac{4}{25}$

$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{25}{200} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$

$0,0147 = \frac{147}{10000}$ .

## ГЛАВА VIII.

### Періодическія десятичныя дроби.

§ 106. Происхожденіе періодическихъ десятичныхъ дробей.

При обращеніи простыхъ дробей мы видѣли, что не всегда получающіяся конечныя десятичныя дроби. Обращивъ на прим. дробь  $\frac{1}{7}$  въ десятичную, получимъ:

$$\begin{array}{r}
 1,0 \overline{) 7} \\
 \underline{7} \phantom{0} \\
 30 \\
 \underline{28} \\
 20 \\
 \underline{14} \\
 60 \\
 \underline{56} \\
 40 \\
 \underline{35} \\
 50 \\
 \underline{49} \\
 10 \\
 \underline{7} \\
 3 \text{ и проч.}
 \end{array}$$

и такъ  $\frac{1}{7} = 0,14285714 \dots$

Легко можно увѣриться, что при обращеніи данной простой дроби въ десятичную, остатки послѣ каждого частнаго дѣленія должны быть менѣе знаменателя данной дроби, потому что оный есть дѣлитель; слѣд. не можетъ быть столько различныхъ остатковъ, сколько единицъ въ знаменателѣ данной дроби; и посему, если дѣленіе будетъ продолжаемо, непременно получатся остатокъ, равный какому нибудь предъидущему остатку, и тогда, при дальнѣйшемъ дѣленіи, тѣже самыя цифры должны повторяться въ частномъ, *т. е.* въ десятичной дроби; и какъ никогда остатокъ не можетъ быть равенъ 0, то десятичная дробь должна имѣть безконечное число знаковъ. Все сіе явствуетъ изъ вышеприведеннаго примѣра. Остатки послѣ частныхъ дѣленій были: 3, 2, 6, 4, 5, 1, потомъ получающіся опять 3, 2 и *т. д.*; откуда видно что въ частномъ должны потомъ повторяться тѣже самыя цифры, и въ томъ же порядкѣ.

Рядъ цифръ, повторяющихся въ одномъ и томъ же порядкѣ, именуется *періодомъ*; а таковыя десятичныя дроби называются *періодическими*.

Въ вышеприведенномъ примѣрѣ періодическая дробь начинается съ первой цифры, но это не всегда бываетъ, на примѣръ:

$$\frac{1}{3} = 0,16666.....$$

$$\frac{1}{44} = 0,02272727.....$$

Въ первомъ примѣрѣ періодъ начинается со втораго знака, а во второмъ съ претвьяго.

Обращеніе простыхъ дробей, имѣющихъ въ знаменателѣ цифру 9, написанную одинъ или нѣсколько разъ, въ десятичныя, заслуживаетъ особенное вниманіе. Обращивъ дроби  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{99}$ ,  $\frac{1}{999}$  и проч. въ десятичныя, получимъ:

$$\frac{1}{9} = 0,1111\dots$$

$$\frac{1}{99} = 0,010101\dots$$

$$\frac{1}{999} = 0,001001001\dots$$

Изъ сихъ примѣровъ явствуешь, что простыя дроби, имѣющія числителемъ единицу, а въ знаменателѣ знакъ 9, написанный одинъ или нѣсколько разъ, превращаются въ періодическія дроби, коихъ періоды состоятъ изъ столькохъ знаковъ, изъ сколькохъ цифръ состоитъ знаменатель данной дроби, и во всякомъ періодѣ первые знаки суть 0, а послѣдній (кромѣ дроби  $\frac{1}{9}$ , въ составѣ періода коей 0 не входитъ).

### § 107. Обращеніе періодическихъ десятичныхъ дробей въ простыя.

Теперь слѣдуетъ показать обратное дѣйствіе, т. е. способъ опредѣлять простыя дроби, отъ коихъ происходятъ данныя періодическія



десятичная дробь. Возмемъ сперва такую дробь, въ коей періодъ начинается съ перваго знака, на прим.  $0,5555\dots$

Сію дробь можно разложить на два множителя, изъ коихъ одинъ равенъ числу составляющему періодъ, ш. е. 5. Чѣмъ найдемъ другой, надлежитъ  $0,5555\dots$  раздѣлить на 5, и найдемъ что оный долженъ быть  $= 0,111\dots$ ; и такъ  $0,5555\dots = 5 \times 0,111$ ; но дробь  $0,111\dots$  происходитъ отъ  $\frac{1}{9}$  (§ 106); слѣд.  $0,555\dots$  происходитъ отъ  $\frac{1}{9}$ , взятой 5 разъ, или отъ  $\frac{5}{9}$ .

Точно такимъ же образомъ можно доказать, что

$$0,353535\dots = 35 \times 0,010101\dots = 35 \times \frac{1}{99} = \frac{35}{99}.$$

$$0,479479479\dots = 479 \times 0,001001001\dots = 479 \times \frac{1}{999} = \frac{479}{999}$$

$$0,001400140014\dots = 14 \times 0,000100010001\dots = 14 \times \frac{1}{9999} = \frac{14}{9999}.$$

Изъ сихъ примѣровъ явствуетъ, что каждая десятичная дробь, коея періоды начинаются съ перваго знака, происходитъ отъ такой простой дроби, коея числитель равенъ числу, составляющему періодъ, а знаменатель составленъ изъ цифры 9, написанной одна подлѣ другой столько разъ, сколько въ періодѣ находится знаковъ (считая и нули).

И такъ  $0,013013013... = \frac{13}{999}$ .

$0,01450145.... = \frac{145}{9999}$  и проч.

Въ предъидущихъ примѣрахъ періодическая дробь начиналась съ перваго знака; рассмотримъ теперь иной случай, когда періодъ начинается не съ первой цифры. Пусть будетъ данная дробь  $0,42222....$

Запятую должно переславить на одинъ знакъ вправо, чтобы получить періодическую дробь, подобную тѣмъ, которыя выше были разсматриваемы, и тогда вмѣсто данной дроби будемъ имѣть:  $4,2222....$ ; но  $4,2222... = 4 + 0,2222.... = 4 + \frac{2}{9} = 4\frac{2}{9}$

Черезъ перестановленіе запятой на одинъ знакъ вправо, дробь увеличилась въ 10 разъ (§98); слѣд.  $4\frac{2}{9}$  въ 10 разъ болѣе оной; и такъ чтобы найти простую дробь, отъ которой происходитъ данная періодическая десятичная дробь, надлежитъ  $4\frac{2}{9}$  раздѣлить на 10.

$$4\frac{2}{9} : 10 = \frac{38}{9} : 10 = \frac{38}{90} = \frac{19}{45};$$

слѣд.  $0,42222.... = \frac{19}{45}$ .

И такъ чтобы въ простую дробь обратить періодическую десятичную дробь, коея періоды не начинаются съ первой цифры, надлежитъ:

1. Поставить запятую предъ тою цифрою, съ которой начинается періодъ.

II. Полученную періодическую дробь обратить въ простую.

III. Придать одну къ цѣлому числу (если есть).

IV. Уменьшить сумму во столько разъ, во сколько данное число было увеличено, при перенесеніи запятой.

## ГЛАВА IX.

### НЕПРЕРЫВНЫЯ ДРОБИ.

§ 108. Происхождение непрерывныхъ дробей.

Случаются дроби, коихъ числители и знаменатели суть взаимно первыя числа. Таковыя дроби не могутъ быть предсавлены въ меньшемъ или простѣйшемъ видѣ; но можно найти дроби, коихъ величина приближается къ величинѣ данныхъ дробей, и копорыя выражаются меньшими числами. Пусть будетъ данная дробь  $\frac{29}{158}$ . Чтобы получить самую простѣйшую приближенную дробь, должно раздѣлить числителя и знаменателя сей дроби на числителя:

$$\begin{array}{r|l} 158 & 29 \\ 145 & 1 \\ \hline 13 \end{array}$$

и такъ  $\frac{29}{158} = \frac{1}{5 + \frac{13}{55}}$  (§ 71. II).



Отбросивъ дробь, находящуюся въ знаменателѣ, получимъ  $\frac{1}{2}$ , первую приближенную величину для данной дроби. Но разность между и данною дробью довольно значительна; ибо послѣдняя равна 1 раздѣленной на  $5\frac{13}{29}$ , а не на 5. Чѣмъ найти вторую приближенную дробь, надлежитъ поступить съ дробью  $\frac{1}{2}$  какъ было поступлено съ данною, т. е., раздѣлить числителя и знаменателя на числителя.

$$\begin{array}{r} 29 \overline{) 13} \\ 26 \phantom{0} \\ \hline 3 \end{array}$$

слѣд.  $\frac{13}{29} = \frac{1}{2 + \frac{3}{29}}$

Представивъ вмѣсто равной величины равную въ выраженіе для данной дроби, будемъ имѣть:

$$\frac{29}{158} = \frac{1}{5 + \frac{13}{29}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{3}{29}}}$$

Отбросивъ въ послѣднемъ знаменателѣ дробь  $\frac{3}{29}$ , получимъ вторую приближенную величину.

$$\frac{1}{5 + \frac{1}{2}}$$

Оную можно представить въ видѣ простой дроби; для сего надлежитъ  $5 + \frac{1}{2}$  привести въ неправильную дробь и раздѣлить 1 на оную:

$$5\frac{1}{2} = 4, \text{ слѣд. } \frac{1}{5 + \frac{1}{2}} = (\S 93) \frac{2}{11}.$$

Чтобъ найти пренную приближенную величину, надобно дробь послѣдняго знаменателя  $\frac{2}{11}$  сократить на числителя и получимъ:

$$\frac{2}{11} = \frac{1}{4 + \frac{1}{2}};$$

$$\text{слѣд. } \frac{29}{158} = \frac{1}{5 + \frac{13}{69}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{3}{13}}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}}}$$

Отбросивъ дробь  $\frac{1}{2}$  въ послѣднемъ знаменателѣ, будемъ имѣть пренную приближенную величину:

$$\frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4}}}$$

По раздѣленіи 1 на  $2\frac{1}{4}$  будетъ:

$$\frac{1}{5 + \frac{4}{3}}$$

Раздѣливъ 1 на  $5\frac{4}{3}$  получимъ  $\frac{3}{29}$ , пренную приближенную величину.

Продолжая точно такимъ же образомъ, можно опредѣлять и слѣдующія приближенные величины.

Дроби, въ семь новомъ видѣ представленныя, называющіяся *непрерывными*, и онымъ можно сдѣлать слѣдующее опредѣленіе: *непрерывныя дроби суть такія, которыя имѣютъ знаменателемъ цѣлое число съ дробью, которая также содержитъ въ своемъ знаменателѣ цѣлое число съ дробью и т. д.*

§ 109. Сокращенный способъ приведенія простыхъ дробей въ непрерывныя.

Изъ данной дроби  $\frac{29}{158}$  мы постепенно получали:

$$\frac{29}{158} = \frac{1}{5 + \frac{13}{29}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{3}{13}}} = \frac{1}{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{5}}}}$$

Первый числитель какъ и всѣ прочія суть 1. Первый знаменатель есть 5; оный произошелъ отъ дѣленія 158 на 29; втораго знаменателя 2 мы нашли, раздѣливъ числителя 29 на остатокъ 13; третьяго знаменателя 4 получили, раздѣливъ первый остатокъ 13 на второй остатокъ 3, и т. д.

На семь замѣчаній основанъ кратчайшій способъ обращенія простыхъ дробей въ непрерывныя. Для сего надлежитъ сперва раздѣлить



знаменателя на числителя, потомъ числителя на первый остатокъ, первый остатокъ на второй и т. д., пока не будетъ 0 въ остаткѣ. Послабая въ числитель 1, а знаменателями полученныя частныя въ томъ же порядкѣ, получимъ искомую непрерывная дробь.

Пусть будетъ данная дробь  $\frac{149}{588}$ .

$$\begin{array}{r}
 960 \overline{) 149} \\
 \underline{894} \phantom{0} \\
 149 \overline{) 66} \\
 \underline{132} \phantom{0} \\
 66 \overline{) 17} \\
 \underline{51} \phantom{0} \\
 17 \overline{) 15} \\
 \underline{15} \phantom{0} \\
 15 \overline{) 2} \\
 \underline{14} \phantom{0} \\
 2 \overline{) 1} \\
 \underline{2} \phantom{0}
 \end{array}$$

$$\text{И такъ } \frac{149}{588} = \frac{1}{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{7 + \frac{1}{2}}}}}$$

~~~~~

## ОТДѢЛЕНІЕ IV.

### ОВЪ ОТНОШЕНІЯХЪ И ПРОПОРЦІЯХЪ.

#### ГЛАВА I.

##### ОВЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

##### § 110. *Объ отношеніяхъ вообще.*

Чтобы имѣть ясное понятіе о величинѣ какого нибудь предмета, должно оный сравнивать съ другими, съ нимъ однородными; поже можно сказать и о числахъ. Изъ 20 и 42 параграфовъ явствуетъ, что сравненіе бываетъ двоякаго рода: во 1<sup>хъ</sup>, можно сравнивать числа для того, чтобы узнать *чѣмъ* одно число болѣе или менѣе другаго; и во 2<sup>хъ</sup>, *во сколько разъ* одно число болѣе или менѣе другаго. На прим. 12 болѣе 4<sup>хъ</sup> осмью единицами, или также въпрое болѣе; напрошивъ, 4 менѣе 12<sup>ми</sup> осмью единицами, или также въпрое менѣе.

Таковой выводъ изъ сравненія чиселъ именуется *отношеніемъ*, которое также бываетъ двоякаго рода, по причинѣ двоякаго сравненія.

*Примѣ. Ч. II.*

Выше (§ 20) было объяснено, что для опредѣленія, *чѣмъ* одно число болѣе или менѣе другого, надлежитъ найти *разность* между данными числами; а посему и отношеніе чиселъ, происходящее изъ сего рода сравненія, называется *разностнымъ* (арифметическимъ).

Также было замѣчено (§ 42), что для опредѣленія, *во сколько разъ* (кратъ) одно число болѣе или менѣе другого, должно раздѣлить большее число на меньшее, и отношеніе чиселъ, изъ таковаго сравненія происходящее, называется *кратнымъ* (геометрическимъ.),

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что *отношеніе чиселъ* бываетъ двоякаго рода: *разностное* и *кратное*. *Разностное отношеніе* есть показаніе *чѣмъ* одно число болѣе или менѣе другого, а *кратное* есть показаніе *во сколько разъ* одно число болѣе или менѣе другого.

## О РАЗНОСТНОМЪ (АРИМЕТИЧЕСКОМЪ) ОТНОШЕНІИ.

### § III. О свойствахъ разностнаго отношенія.

Поскольку разностное отношеніе между двумя числами опредѣляется ихъ разностію, которая находится посредствомъ вычитанія, то для означенія разностнаго отношенія употребляется



знакъ вычитанія, который спавинся между данными числами. И такъ  $12 - 7$  естьъ выраженіе разностнаго отношенія между 12 и 7.

Числа 12 и 7, между коими опредѣляется отношеніе, называющіяся членами онаго. Первое число 12 именуется *предвѣдущимъ* членомъ, а второе 7 *послѣдующимъ*.

При измѣненіи одного изъ членовъ должно измѣняться и отношеніе между оными. Пусть будетъ дано разностное отношеніе:  $15 - 6$ . Если къ первому члену будетъ придано произвольное число 2, то разность увеличится на тоже число (§ 23), и посему отношеніе между числами измѣнится. Также если къ меньшему числу 6 прибавится произвольное число 5, то разность уменьшится на то же число; а посему и отношеніе между числами измѣнится. Если же къ обоимъ числамъ прибавится одно и тоже произвольное число, на прим. 5, то разность останется таже (ибо, на какое число она увеличивается отъ увеличиванія большаго, на такое же число уменьшается отъ увеличиванія меньшаго числа); слѣд. отношеніе между полученными числами 20 и 11 будетъ тоже, какое и между данными числами 15 и 6.

Подобнымъ же образомъ можно вывести, что разностное отношеніе между данными числами не измѣнится, если изъ обоихъ членовъ будетъ вычтено какое нибудь число.

Пусть будетъ дано разностное отношеніе:  $22 - 10$ , въ коемъ разность равна  $12$ ; вычтя изъ обоихъ членовъ произвольное число  $7\frac{1}{2}$ , получимъ новое разностное отношеніе:  $14\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ , въ коемъ разность также равна  $12$ .

§ 112. *Раздѣленіе разностнаго отношенія на прямое и обратное.*

Изъ предъидущаго параграфа явствуетъ, что можетъ быть множество разностныхъ отношеній, въ коихъ разности равны.

|          |                               |                                      |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Примѣры: | $11\frac{1}{2} - 8$           | } разность<br>равна $3\frac{1}{2}$ . |
|          | $9\frac{3}{4} - 6\frac{1}{4}$ |                                      |
|          | $7 - 3\frac{1}{2}$            |                                      |

Во всѣхъ сихъ разностныхъ отношеніяхъ разности равны, и таковыя отношенія называются *равными*. При семъ должно замѣтить, что числа расположены одинакимъ образомъ, т. е., во всѣхъ отношеніяхъ предъидущіе члены болѣе послѣдующихъ, и въ семъ случаѣ разностныя отношенія называются *прямыми*. Если же въ двухъ разностныхъ отношеніяхъ разности хотя и будутъ равны, но члены расположены не одинакимъ образомъ, на примѣръ:

$20 - 14$ , разность между членами равна  $6$ ,

$3 - 9$ , разность также равна  $6$ ;

то въ такомъ случаѣ отношенія называются *обратными*. И такъ *прямыми разностными*

отношеніями называются такі, въ коихъ разности равны, и члены расположены одинакимъ образомъ. Обратными разностными отношеніями называются такіа, въ коихъ разности между членами равны, но члены расположены различнымъ образомъ, п. е., если въ 1<sup>мъ</sup> отношеніи предъидущій членъ болѣе послѣдующаго, то во 2<sup>мъ</sup> предъидущій долженъ быть менѣе послѣдующаго такимъ же числомъ, и обратно: если въ 1<sup>мъ</sup> отношеніи предъидущій членъ менѣе послѣдующаго, то во 2<sup>мъ</sup> предъидущій долженъ быть болѣе послѣдующаго такимъ же числомъ.

## О КРАТНОМЪ (ГЕОМЕТРИЧЕСКОМЪ) ОТНОШЕНІИ.

### § 113. О знаменателѣ отношенія.

Поелику кратное отношеніе между двумя числами опредѣляется частнымъ числомъ, которое находится посредствомъ дѣленія, то для означенія кратнаго отношенія принять знакъ дѣленія, который ставится между данными числами. И такъ выраженіе, 16:8 есть выраженіе кратнаго отношенія между 16 и 8. Числа, сосставляющія отношеніе, называются членами онаго; первое число именуется *предъидущимъ* членомъ, а второе *послѣдующимъ*.



Для опредѣленія знаменателя отношенія будемъ всегда дѣлить предъидущій членъ на послѣдующій. А изъ сего слѣдуетъ, что знаменатель можетъ быть цѣлымъ числомъ, когда въ предъидущемъ членѣ послѣдующій заключается цѣлое число разъ; смѣшаннымъ, когда въ предъидущемъ послѣдующій заключается не цѣлое число разъ; дробнымъ, когда предъидущій членъ менѣе послѣдующаго; на прим.

въ отношеніяхъ:  $24:8$  знаменатель 3,  
 $43:5$  знаменатель  $8\frac{3}{5}$ ,  
 $20:25$  знаменатель  $\frac{4}{5}$ .

Въ первыхъ двухъ случаяхъ знаменатель показывается, *во сколько разъ* предъидущій больше своего послѣдующаго; а въ послѣднемъ, *какую часть* онаго составляетъ.

Послѣку при опредѣленіи знаменателя предъидущій членъ всегда принимается за дѣлимое, послѣдующій за дѣлителя, а частное за знаменателя, и какъ дѣлимое равно дѣлителю, умноженному на частное (§ 35); то *во всякомъ кратномъ отношеніи предъидущій членъ равенъ послѣдующему, умноженному на знаменателя.*

# § 114. О свойствахъ кратнаго отношенія.

Разсмотримъ теперь, какія переменныя должны происходить въ знаменатель отношенія, при умноженіи и дѣленіи членовъ оного. Пусть будетъ данное отношеніе  $24:8$ , въ коемъ знаменатель равенъ 3.

Если умножится первый членъ на произвольное число, на прим. 5, то знаменатель долженъ увеличиться въ 5 разъ, потому что (§ 45. I) частное увеличивается, когда умножается дѣлимое, а дѣлитель остается попрежнему. И въ самомъ дѣлѣ знаменатель новаго кратнаго отношенія ( $120:8$ ) равенъ 15.

Если же умножится второй членъ даннаго отношенія на какое нибудь число, на прим. 4, то знаменатель уменьшится въ 4 раза, потому что (§ 45. II) частное уменьшается, когда умножается дѣлитель, а дѣлимое не измѣняется. И въ самомъ дѣлѣ знаменатель новаго кратнаго отношенія ( $24:32$ ) равенъ  $\frac{3}{4}$  или  $\frac{3}{4}$ , т. е., въ 4 раза менѣе 3.

Изъ сихъ двухъ случаевъ слѣдуетъ, что знаменатель не измѣняется, если оба члена будутъ умножены на одно и то же число; ибо во сколько разъ оный увеличивается отъ умноженія 1<sup>го</sup> члена, во столько же разъ уменьшается отъ умноженія второго. На прим. въ отно-

шеніи 20:5 знаменатель 4; умноживъ оба члена на произвольное число 7, получимъ новое отношеніе (140:35), въ которомъ знаменатель равенъ  $\frac{140}{35}$  или 4.

Подобнымъ же образомъ можно вывести, что и при дѣленіи обоихъ членовъ одного отношенія на одно и то же число знаменатель не измѣняется, ибо во сколько разъ оный уменьшается отъ дѣленія перваго члена, во столько же разъ увеличивается отъ дѣленія втораго.

### § 115. Раздѣленіе кратнаго отношенія на прямое и обратное.

Знаменатели двухъ или нѣсколькихъ кратныхъ отношеній могутъ быть равны и не равны; въ первомъ случаѣ кратныя отношенія называются *равными*.

На прим. кратныя отношенія:

$$20:80$$

$$4:16$$

равны, потому что въ каждомъ знаменатель равенъ  $\frac{1}{4}$ .

Изъ равенства знаменателей двухъ равныхъ кратныхъ отношеній слѣдуетъ, что предъидущій членъ перваго отношенія долженъ быть во столько разъ болѣе или менѣе своего послѣдующаго, во сколько разъ предъидущій вто-



раго отношенія болѣе или менѣе своего послѣдующаго. Въ вышеприведенномъ примѣрѣ первый членъ (20) перваго отношенія менѣе своего послѣдующаго (80) въ 4 раза, также и во второмъ отношеніи первый членъ 4 менѣе своего послѣдующаго (16) въ 4 раза. Таковыя крапныя отношенія называются *прямыми*.

Если же въ двухъ крапныхъ отношеніяхъ предъидущій членъ перваго отношенія во столько разъ *болѣе* своего послѣдующаго, во сколько предъидущій втораго отношенія *менѣе* своего послѣдующаго; или, если предъидущій членъ перваго отношенія во столько разъ *менѣе* своего послѣдующаго, во сколько во второмъ *болѣе*: то таковыя крапныя отношенія называются *обратными*. На прим. въ крапномъ отношеніи 30:5, первый *болѣе* втораго въ 6 разъ; а въ отношеніи  $\frac{1}{2}$ :3, первый членъ *менѣе* втораго въ 6 разъ; въ такомъ случаѣ числа 30 и 5 находятся въ обратномъ отношеніи съ другими числами, ш. е., съ  $\frac{1}{2}$  и 3.

#### § 116. Сокращеніе членовъ кратнаго отношенія.

Въ § 114 было доказано, что крапное отношеніе между двумя числами не измѣняется, если оба числа будутъ раздѣлены на одно и то же число.

Пусть будетъ данное кратное отношеніе: 45:27. Оба члена дѣлятся на 9 (§ 73); раздѣливъ на 9 превратимъ данное отношеніе въ слѣдующее: 5:3, знаменатель коего будетъ равенъ знаменателю данного отношенія. И такъ члены данного отношенія уменьшились, но сохранили между собою то же самое отношеніе.

Сіе дѣйствіе называется *сокращеніемъ* членовъ отношенія. Изъ примѣра явствуетъ, что для сокращенія членовъ кратнаго отношенія надлежитъ раздѣлить оныя на общаго дѣлителя.

§ 117. *Изображеніе кратнаго отношенія между дробными числами въ цѣлыхъ числахъ.*

Также было доказано (въ § 114), что кратное отношеніе между двумя числами не измѣняется, если оба члена будутъ умножены на одно и то же число. На семъ свойствѣ кратнаго отношенія основано изображеніе отношенія между дробями въ цѣлыхъ числахъ.

Здѣсь могутъ быть два случая: I. дроби могутъ имѣть одинакихъ знаменателей, и II. разныхъ знаменателей.

I. *Случай.* Пусть будетъ дано кратное отношеніе:  $\frac{5}{8} : \frac{3}{8}$ .

Опиавъ знаменателей въ обѣихъ дробяхъ, увеличимъ оба члена въ 8 разъ; а посему отношеніе между 5 и 3 должно быть равно отношенію между  $\frac{40}{8}$  и  $\frac{24}{8}$  (§ 114).

2й Случай. Дроби съ различными знаменателями можно (§ 78) всегда привести къ одному; слѣд. для изображенія кратнаго отношенія между дробями съ разными знаменателями, надлежитъ только привести ихъ къ одному, и потомъ поступать какъ въ 1<sup>му</sup> случаѣ показано, т. е, отбросить знаменателей.

Примѣръ. Изобразить кратное отношеніе:  $\frac{2}{3} : \frac{3}{7}$  въ цѣлыхъ числахъ.

Приведа данныя дроби къ одному знаменателю, будемъ:  $\frac{2}{3} : \frac{3}{7} = \frac{14}{33} : \frac{15}{33} =$  (по 1<sup>му</sup> случаю)  $14 : 15$ .

Если данное кратное отношеніе состоитъ изъ смѣшанныхъ чиселъ, или изъ смѣшанныхъ чиселъ и цѣлыхъ, и проч., то во всѣхъ сихъ случаяхъ надлежитъ сперва привести члены въ неправильныя дроби, имѣющія одинакихъ знаменателей, и потомъ поступать по выше-сказанному правилу.

Примѣръ. Изобразить кратное отношеніе между  $3\frac{1}{2}$  и 2 въ цѣлыхъ числахъ.

Приведа оба члена въ неправильныя дроби, получимъ:

$$3\frac{1}{2} : 2 = \frac{7}{2} : \frac{4}{2} = 7 : 4 = 13 : 8.$$



Изобразимъ теперь кратное отношеніе между дробями, имѣющими *одинакихъ* числителей, но *разныхъ* знаменателей въ цѣлыхъ числахъ; на прим. кратное отношеніе между  $\frac{1}{3}$  и  $\frac{1}{6}$ . Приведя къ одному знаменателю, получимъ:  $\frac{1}{3} : \frac{1}{6} = \frac{2}{6} : \frac{1}{6} = 2:1$ .

Возьмемъ еще одинъ примѣръ, въ которомъ бы числители были болѣе единицы. Положимъ, что пребудется изобразить кратное отношеніе между  $\frac{2}{3}$  и  $\frac{2}{5}$  въ цѣлыхъ числахъ. По раздѣленіи обоихъ членовъ на 3, данное отношеніе обратится въ слѣдующее:  $\frac{1}{3} : \frac{1}{5}$ ; но  $\frac{1}{3} : \frac{1}{5} = \frac{5}{15} : \frac{3}{15} = 5:3$ ; слѣд. и  $\frac{2}{3} : \frac{2}{5} = 5:3$ .

*И такъ дроби съ одинаковыми числителями, но разными знаменателями находятся въ обратномъ отношеніи съ своими знаменателями; п. е., первая дробь относится ко второй, такъ какъ знаменатель второй къ знаменателю первой.*

### § 118. О сложномъ кратномъ отношеніи.

Если сходственные члены двухъ или болѣе кратныхъ отношеній будутъ сложены, вычтены, перемножены и раздѣлены, то получатся суммы, разности, произведенія и частныя, составляющія новыя кратныя отношенія, называемыя *сложными*. Здѣсь будетъ разсмотрѣно сложное отношеніе только въ двухъ случаяхъ:

I. Сложное отношеніе, происходящее отъ сложенія сходственныхъ членовъ двухъ или болѣе кратныхъ отношеній, имѣющихъ равныхъ знаменателей. II. Сложное отношеніе, происходящее отъ умноженія сходственныхъ членовъ двухъ или болѣе кратныхъ отношеній, имѣющихъ какихъ нибудь знаменателей.

*1<sup>й</sup> Случай.* Пусть будущъ данныя кратныя отношенія, имѣющія равныхъ знаменателей:

$$14:2$$

$$35:5.$$

Сложивъ сходственные члены данныхъ отношеній, коихъ знаменатели равны 7, получимъ новое кратное отношеніе:  $49:7$ , въ копоромъ знаменатель будетъ равенъ также 7, т. е., знаменателю каждаго даннаго отношенія — что и должно быть, потому что 2 содержится въ  $14^{\text{ти}}$  7 разъ, и 5 заключается въ  $35^{\text{ти}}$  7 разъ; а изъ сего слѣдуемъ, что и сумма первыхъ двухъ чиселъ, т. е.,  $2+5$  должна содержаться въ суммѣ послѣднихъ, т. е., въ  $14+35$ , 7 разъ. И такъ, если будутъ сложены сходственные члены двухъ кратныхъ равныхъ отношеній, то составитъ новое кратное отношеніе, коего знаменатель равенъ знаменателю даннаго отношенія.

Тоже самое можно вывести и для сложнаго отношенія, состоящаго изъ трехъ или болѣе крапныхъ равныхъ отношеній.

2<sup>й</sup> *Случай*. Пусть будутъ даны два крапныхъ отношенія:

$$3:8$$

$$16:5.$$

Перемноживъ сходственные члены, получимъ сложное крапное отношеніе: 48:40. Разсмотримъ, чему равенъ знаменатель онаго. Если бы мы умножили только предъидущій членъ перваго отношенія на предъидущій втораго, то знаменатель увеличился бы въ 16 разъ (§ 114); но какъ и послѣдующій членъ перваго отношенія былъ умноженъ на послѣдующій втораго, то знаменатель уменьшился въ 5 разъ; слѣд. знаменатель сложнаго крапнаго отношенія долженъ быть болѣе знаменателя перваго отношенія въ  $\frac{16}{5}$  раза, т. е., во столько разъ, сколько единицъ во знаменателѣ втораго отношенія, или равенъ произведенію изъ обоихъ знаменателей ( $\frac{8}{3} \times \frac{16}{5}$ ).

Тоже самое можно доказать и въ такомъ случаѣ, когда сложное крапное отношеніе состоятъ изъ трехъ или болѣе данныхъ крапныхъ отношеній.



## ГЛАВА II.

## О ПРОПОРЦІЯХЪ.

## § 119. О пропорціяхъ вообще.

Выше было сказано, что отношенія могутъ быть двоякаго рода: разностныя и кратныя, и что отношенія обоихъ родовъ могутъ быть равныя.

Соединеніе двухъ равныхъ отношеній одного рода называется *пропорціею*. И поелику отношенія могутъ быть двоякаго рода, то и пропорція можетъ быть или *разностная* (арифметическая), или *кратная* (геометрическая). Первая состоитъ изъ двухъ равныхъ разностныхъ, а вторая изъ двухъ равныхъ кратныхъ отношеній.

Поелику въ каждомъ отношеніи заключаются два числа, то въ пропорціи, состоящей изъ двухъ отношеній должно быть четыре числа, которые называются *членами*. Первый и четвертый члены именуются *крайними*, второй и третій *средними*, первый и третій *предъидущими*, а второй и четвертый *послѣдующими*.

Должно замѣтить, что въ разностныхъ пропорціяхъ:

$$13 - 6 = 11 - 4,$$

$$3 - 9 = 2\frac{1}{2} - 8\frac{1}{2},$$

первый членъ шѣмъ же числомъ болѣе или менѣе вшораго, какимъ прешій членъ болѣе или менѣе четвертаго, потому что разности обоихъ отношеній равны.

Точно такъ и въ крапныхъ пропорціяхъ

$$21 : 7 = 42 : 14,$$

$$5 : 20 = 3 : 12,$$

первый членъ во столько же разъ болѣе или менѣе вшораго, во сколько прешій членъ болѣе или менѣе четвертаго, потому что знаменатели отношенія равны.

## О РАЗНОСТНОЙ (АРИМЕТИЧЕСКОЙ) ПРОПОРЦІИ.

### § 120. О главномъ свойствѣ разностной пропорціи.

Уже было замѣчено, что въ разностной пропорціи предъидущіе члены могутъ быть болѣе и менѣе своихъ послѣдующихъ; посему, чтобы можно было сдѣлать строгое заключеніе, надлежитъ разсмотрѣть оба случая.

**1<sup>ый</sup> Случай.** Если предъидущіе члены болѣе послѣдующихъ, на прим.

$$13 - 6 = 11 - 4.$$

Изъ равенства отношеній слѣдуетъ, что первый членъ такимъ же числомъ болѣе втораго, какимъ четвертый менѣе третьяго; изъ сего же слѣдуетъ, что сумма перваго и четвертаго членовъ должна быть равна суммѣ втораго и третьяго.

Чтобъ совершенно увѣриться въ сему свойствѣ разностной пропорціи, изслѣдуемъ оное поочнѣ.

Сумма крайнихъ членовъ состоитъ изъ 1<sup>го</sup> и 4<sup>го</sup>; но 1<sup>й</sup> членъ, какъ болѣе въ 1<sup>мѣ</sup> отношеніи, равенъ 2<sup>му</sup> и разности: и такъ, поставивъ вмѣсто 1<sup>го</sup> члена 2<sup>й</sup> членъ и разность, будемъ имѣть:

$$\text{Сумма крайн. чл.} = 2 \text{ чл.} + \text{разн.} + 4 \text{ чл.}$$

Сумма среднихъ членовъ состоитъ изъ 2<sup>го</sup> и 3<sup>го</sup>; но 3<sup>й</sup> членъ, какъ болѣе во второмъ отношеніи, равенъ 4<sup>му</sup> и разности; слѣд. взявъ вмѣсто 3<sup>го</sup> члена 4 членъ и разность, получимъ:

$$\text{Сумма средн. чл.} = 2 \text{ чл.} + 4 \text{ чл.} + \text{разн.}$$

И такъ сумма крайнихъ членовъ и сумма среднихъ состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же частей; слѣд. должны быть равны.

2<sup>й</sup> Случай. Если предыдущіе члены менѣе послѣдующихъ, на прим.

$$3 - 9 = 2\frac{1}{2} - 8\frac{1}{2}.$$



Сумма крайнихъ членовъ состоить изъ 1<sup>го</sup> и 4<sup>го</sup>; но четвертый членъ, какъ большій во 2<sup>мъ</sup> отношеніи, состоить изъ 3<sup>го</sup> члена и разности; и такъ, поставивъ вмѣсто 4<sup>го</sup> члена равныя ему числа, найдемъ, что

Сумма крайн. чл. = 1 чл. + 3 чл. + разн.

Сумма среднихъ членовъ состоить изъ 2<sup>го</sup> и 3<sup>го</sup>; но 2<sup>й</sup> членъ, какъ большій членъ въ первомъ отношеніи, состоить изъ перваго и разности; взявъ вмѣсто втораго члена равныя ему числа, найдемъ что,

Сумма средн. член. = 1 чл. + разн. + 3чл.

И такъ сумма крайнихъ членовъ и сумма среднихъ состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же частей; слѣд. должны быть равны.

Изъ всего, что было сказано, можно заключить, что во всякой разностной пропорціи сумма крайнихъ членовъ равна суммѣ среднихъ.

### § 121. *Опредѣленіе неизвѣстныхъ членовъ разностной пропорціи.*

Основываясь на свойствѣ разностной пропорціи, доказанномъ въ предъидущемъ параграфѣ, легко можно находить одинъ изъ членовъ оной, когда прочіе извѣстны.

Пусть въ данной разностной пропорціи неизвѣстенъ послѣдній членъ, который будемъ означать Лапінскою буквою *x*, на прим.

$$14 - 12 = 17 - x.$$

Уже доказано, что сумма крайних членов равна суммѣ средних, копорая равна 29; слѣд. сумма крайнихъ равна также 29. Одинъ изъ крайнихъ членовъ, ш. е. первый, равенъ 14; слѣд. другой крайній членъ, ш. е, четвертый, долженъ быть равенъ остаточной части цѣлой суммы. И такъ, чтобъ найти оный, надлежитъ изъ 29 вычесть 14, и остатокъ 15 будетъ искомое число; слѣд.

$$14 - 12 = 17 - 15.$$

Можно еще другимъ образомъ опредѣлить послѣдній членъ разностной пропорціи, основываясь на томъ, что отношенія, оную составляющія, должны быть равны. Въ первомъ отношеніи предъидущій членъ болѣе послѣдующаго 2<sup>м</sup>; слѣд. и во второмъ отношеніи предъидущій членъ 17 долженъ быть болѣе послѣдующаго 2<sup>м</sup>. И такъ, чтобъ опредѣлить оный, должно 2 вычесть изъ 17, и остатокъ 15 будетъ искомое число.

Положимъ, что въ данной разностной пропорціи одинъ изъ средних членовъ будетъ неизвѣстенъ, на прим. прешій:

$$21 - 27 = x - 16.$$

Сумма крайнихъ членовъ равна 37; слѣд. и сумма среднихъ равна 37. Одинъ изъ оныхъ

равенъ 27; слѣд. другой долженъ быть равенъ остальной части найденной суммы; и такъ, для опредѣленія онаго, надлежитъ вычесть 27 изъ 37, и остатокъ 10 будетъ искомымъ претій членъ, п. е.,

$$31 - 27 = 10 - 16 ;$$

слѣд. чтобы найти претій членъ разностной пропорціи, слѣдуетъ только изъ суммы крайнихъ членовъ вычесть впорый членъ.

Подобнымъ образомъ можно вывести, что если въ разностной пропорціи изъ суммы крайнихъ членовъ вычтемъ претій, получимъ впорый членъ; если же изъ суммы среднихъ членовъ вычтемъ четвертый, то найдемъ первый членъ.

И такъ, если въ разностной пропорціи одинъ изъ крайнихъ членовъ неизвѣстенъ, то для опредѣленія онаго надлежитъ изъ суммы среднихъ членовъ вычесть другой крайній членъ; если же одинъ изъ среднихъ членовъ неизвѣстенъ, то для опредѣленія онаго слѣдуетъ изъ суммы крайнихъ членовъ вычесть извѣстный средній членъ.

§ 122. О непрерывной разностной пропорціи.

Иногда въ разностной пропорціи средние члены равны между собою; на прим.

$$13 - 19 = 19 - 25.$$



Въ такомъ случаѣ она называется *непрерывною*; а каждый средній членъ *среднимъ разностнымъ числомъ* (или *среднимъ арифметическимъ числомъ*).

Изъ § 121-слѣдуетъ, что и въ непрерывной разностной пропорціи сумма крайнихъ членовъ равна суммѣ среднихъ; но какъ средніе члены равны между собою, то сумма среднихъ членовъ должна быть равна какому нибудь изъ среднихъ членовъ, дважды взятому.

Изъ сего же слѣдуетъ:

I. Чтобы найти который нибудь изъ крайнихъ членовъ непрерывной разностной пропорціи, слѣдуетъ только изъ удвоеннаго средняго члена вычесть извѣстный крайній.

II. Чтобы найти средній членъ непрерывной разностной пропорціи, надлежитъ сумму крайнихъ раздѣлить на 2.

### § 123. *Отыскиваніе средняго разностнаго числа.*

На семъ послѣднемъ выводѣ основывается отыскиваніе средняго разностнаго числа нѣсколькихъ данныхъ чиселъ. Поелику для опредѣленія средняго числа, если даны два числа, сумма данныхъ чиселъ дѣлилась на 2, т. е., на число членовъ; то для опредѣленія средняго числа нѣсколькихъ чиселъ, должно раздѣлить сумму членовъ на число оныхъ.

Пусть будутъ данныя числа: 23, 24, 28 и 29, и требуется опредѣлить среднее ихъ число. Сложивъ оныя:

$$\begin{array}{r} 23 \\ 24 \\ 28 \\ 29 \\ \hline 104, \end{array}$$

получимъ

раздѣливъ сію сумму на число членовъ, п. е. на 4,

$$\begin{array}{r|l} 104 & 4 \\ 8 & 26 \\ \hline 24 & \\ 24 & \\ \hline \end{array}$$

будемъ имѣть въ частномъ 26, которое и должно быть среднимъ разностнымъ числомъ.

О КРАТНОЙ (ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ) ПРОПОРЦІИ.

§ 124. О главномъ свойствѣ кратной пропорціи.

Выше было доказано, что во всякой разностной пропорціи сумма крайнихъ членовъ равна суммѣ среднихъ. Кратная пропорція имѣетъ сходное свойство, а именно: произведеніе крайнихъ членовъ равно произведенію среднихъ.

Возьмемъ какую нибудь кратную пропорцію:

$$12:8=9:6.$$

Произведение крайних членов состоитъ изъ 1<sup>го</sup> умноженнаго на 4<sup>й</sup>; 1<sup>й</sup> же членъ, какъ предъидущій перваго отношенія, равенъ своему послѣдующему, т. е., 2<sup>му</sup> члену, умноженному на знаменателя (§ 113); взявъ вмѣсто 1<sup>го</sup> члена обоихъ множителей его составляющихъ, найдемъ, что

Произв. крайн. чл. = 2 чл.  $\times$  знам.  $\times$  4 чл.

Произведение средних членовъ состоитъ изъ 2<sup>го</sup>, умноженнаго на 3<sup>й</sup>; 3<sup>й</sup> же членъ, какъ предъидущій втораго отношенія, равенъ своему послѣдующему, т. е. 4<sup>му</sup>, умноженному на знаменателя; слѣд. взявъ вмѣсто 3<sup>го</sup> обоихъ множителей, его составляющихъ, получимъ:

Произв. сред. член. = 2 чл.  $\times$  4 чл.  $\times$  знам.

Изъ сего явствуетъ, что произведение крайнихъ членовъ и произведение среднихъ состоитъ изъ однихъ и тѣхъ же множителей, и посему должны быть равны.

### § 125. *Опредѣленіе членовъ кратной пропорціи.*

На свойствѣ кратной пропорціи, доказанномъ въ предъидущемъ параграфѣ, основывается опредѣленіе одного изъ членовъ оной когда прочіе извѣстны.

Положимъ, что требуется найти четвертый членъ кратной пропорціи, въ которой первые три извѣстны; на прим.



$$45:9 = 25:x.$$

Уже доказано, что произведение средних членов равно произведению крайних. Въ сей пропорціи произведение средних равно 225, слѣд. и произведение крайнихъ также равно 225; но одинъ изъ оныхъ равенъ 45, слѣд. другой, т. е., искомый членъ долженъ быть равенъ 225, раздѣленнымъ на 45, или  $x = 5$ ; и такъ

$$45:9 = 25:5,$$

слѣд. чтобы найти четвертый членъ надлежитъ произведение средних раздѣлить на первый членъ.

Можно найти четвертый членъ еще другимъ образомъ, основываясь на равенствѣ отношеній. Въ 1<sup>мъ</sup> отношеніи предъидущій болѣе послѣдующаго въ 5 разъ; слѣд. и во второмъ предъидущій членъ долженъ быть болѣе послѣдующаго въ 5 разъ; слѣд. чтобы найти четвертый членъ, должно 25 раздѣлить на 5, и частное 5 будетъ искомое число.

Положимъ теперь, что требуется опредѣлить претій членъ крайней пропорціи, въ которой всѣ прочіе члены извѣстны; на прим.

$$36:12 = x:10.$$

Произведение крайнихъ равно 360, слѣд. и произведение средних равно 360. Одинъ изъ среднихъ равенъ 12, слѣд. другой долженъ

быть равенъ найденному произведенію, раздѣленному на 12, т. е.  $x = 30$ ; и такъ

$$36:12 = 30:10.$$

слѣд. чтобы найти претій членъ крапной пропорціи, надлежитъ произведеніе крайнихъ раздѣлить на вторый членъ.

Подобнымъ же образомъ выводится, что первый членъ равенъ произведенію среднихъ, раздѣленному на четвертый, а вторый равенъ произведенію крайнихъ, раздѣленному на претій.

Изъ вышедоказаннаго можно вывести слѣдующее заключеніе: если въ кратной пропорціи одинъ изъ крайнихъ членовъ неизвѣстенъ, то для опредѣленія онаго надлежитъ произведеніе среднихъ раздѣлить на другой крайній; если же одинъ изъ среднихъ неизвѣстенъ, то для опредѣленія онаго слѣдуетъ произведеніе крайнихъ раздѣлить на извѣстный средній членъ.

#### § 126. Сокращеніе членовъ кратной пропорціи.

Пусть будетъ данная крапная пропорція:

$$36:24 = 39:x.$$

Разсмотримъ, какіе члены можно сокращать не нарушая пропорціи:

I. Въ § 116 было доказано, что знаменатель отношенія не перемѣняется, если оба члена раздѣляются на одно и тоже число. 36 и 24 дѣлятся на общаго дѣлителя 12. По раздѣленіи на 12, данная пропорція приметъ слѣдующій видъ:

$$3:2=39:x.$$

Поселику знаменатель перваго отношенія не перемѣнился, то и отношеніе между 39 и искомымъ числомъ не перемѣнилось; слѣд. и неизвѣстное число также не перемѣнилось. Очевидно, что оное изъ второй пропорціи удобнѣе опредѣляется, нежели изъ первой.

$$\text{Изъ 1}^{\text{й}}: x = \frac{24 \times 39}{36} = \frac{936}{36} = 26.$$

$$\text{Изъ 2}^{\text{й}}: x = \frac{2 \times 39}{3} = \frac{78}{3} = 26.$$

И такъ 1<sup>й</sup> членъ пропорціи можетъ быть сокращаемъ со 2<sup>мъ</sup>.

II. Если раздѣлимъ 1<sup>й</sup> членъ, то знаменатель перваго отношенія уменьшится; оный также уменьшится и во второмъ отношеніи во столько же разъ, если 3<sup>й</sup> членъ будетъ раздѣленъ на тоже число; изъ сего слѣдуетъ, что если 1<sup>й</sup> и 3<sup>й</sup> члены раздѣлятся на одно и тоже число, то знаменатели отношенія хотя измѣнятся, но останутся равными, потому что уменьшаются въ одинаковое число



равъ; изъ равенства же отношеній слѣдуетъ, что пропорція не нарушится. И такъ 1<sup>й</sup> членъ можетъ быть еще сокращаемъ съ 3<sup>мъ</sup>.

Пусть будетъ пропорція:

$$125:55=75:x.$$

Раздѣливъ 1<sup>й</sup> и 3<sup>й</sup> члены на общаго дѣлителя 25, получимъ:

$$5:55=3:x.$$

Раздѣливъ первые два члена на 5:

$$1:11=3:x.$$

$$\text{слѣд. } x = \frac{11 \times 3}{1} = 33.$$

Изъ данной же пропорціи:

$$x = \frac{55 \times 75}{125} = \frac{4125}{125} = 33.$$

Здѣсь сомнѣніе можетъ быть отъ того, что 3<sup>й</sup> членъ, отъ котораго 4<sup>й</sup> зависитъ, уменьшенъ; но сіе сомнѣніе исчезнетъ, если будетъ обращено вниманіе на 1<sup>й</sup> членъ, который также уменьшится. И такъ, хотя множитель 75, отъ котораго неизвѣстное число зависитъ (ибо  $x = \frac{55 \times 75}{125}$ ) уменьшенъ, но и дѣлитель 125 уменьшенъ во столько же разъ, а посему искомое число не измѣнится.

Такимъ же образомъ можно доказать, что 2<sup>й</sup> членъ сокращается съ 1<sup>мъ</sup> и 4<sup>мъ</sup>; 3<sup>й</sup> членъ сокращается съ 1<sup>мъ</sup> и 4<sup>мъ</sup>; 4<sup>й</sup> членъ сокращается со 2<sup>мъ</sup> и 3<sup>мъ</sup>.

Или вообще: каждый изъ крайнихъ членовъ можетъ быть сокращаемъ съ каждымъ изъ среднихъ, и обратно: каждый изъ среднихъ можетъ быть сокращаемъ съ каждымъ изъ крайнихъ.

§ 127. *Перемѣшеніе членовъ кратной пропорціи.*

Теперь надлежитъ изслѣдовать, какимъ образомъ члены кратной пропорціи могутъ быть перемѣщаемы безъ нарушенія оной.

Пусть будетъ данная пропорція:

$$I. 30 : 15 = 24 : 12.$$

Переставивъ средніе члены, пропорція приметъ слѣдующій видъ:

$$II. 30 : 24 = 15 : 12.$$

Чтобъ доказать вѣрность сей пропорціи, надлежитъ доказать, что предъидущіе члены данной пропорціи (30 и 24) содержатся между собою, какъ ихъ послѣдующія (15 и 12).

Первый членъ пропорціи состоитъ изъ втораго, умноженнаго на знаменателя (§ 113) а третій изъ четвертаго, умноженнаго также на знаменателя. Изъ сего слѣдуетъ, что если первый членъ раздѣлится на знаменателя, то получится въ частномъ второй членъ; если же третій членъ раздѣлится на знаменателя, то въ частномъ получится 4

членъ; но выше было доказано, что если два числа будутъ раздѣлены (§ 116) на одно и тоже число, то отношеніе между полученными числами должно быть равно отношенію между данными; а изъ сего и слѣдуетъ, что отношеніе между 1<sup>мъ</sup> и 3<sup>мъ</sup> членами должно быть равно отношенію между 2<sup>мъ</sup> и 4<sup>мъ</sup>; слѣд. средніе члены могутъ быть переставлены безъ нарушенія пропорціи.

Въ данной пропорціи знаменатель отношенія равенъ 2; раздѣливъ на оный предъидущіе члены 30 и 24, получимъ въ частныхъ 15 и 12, т. е. послѣдующіе члены; слѣд. (§ 116) предъидущія члены 30 и 24 должны относиться между собою какъ послѣдующіе 15 и 12; слѣд. изъ оныхъ можно составить пропорцію.

Очевидно, что пропорція не нарушится, если первое отношеніе сдѣлаемъ вторымъ, и второе первымъ; ибо знаменатели отношеній останутся равными.

Итакъ первая пропорція можетъ быть представлена въ слѣдующемъ видѣ:

$$\text{III. } 24 : 12 = 30 : 15.$$

а вторая:

$$\text{IV. } 15 : 12 = 30 : 24.$$

Изъ самаго свойства крайней пропорціи слѣдуетъ, что послѣдующій членъ 1<sup>го</sup> отношенія во столько разъ болѣе или менѣе сво-



его предъидущаго, во сколько разъ послѣдующій членъ 2<sup>го</sup> отношенія болѣе или менѣе своего предъидущаго, п. е., послѣдующій членъ 1<sup>го</sup> отношенія долженъ относиться къ своему предъидущему, какъ послѣдующій членъ 2<sup>го</sup> отношенія къ своему предъидущему.

Основываясь на семъ можно предсавить данную пропорцію еще въ чепырехъ новыхъ видахъ, сдѣлавъ въ каждой изъ вышеупомянутыхъ чепырехъ пропорцій послѣдующіе члены предъидущими, а предъидущіе послѣдующими:

Изъ 1<sup>й</sup> получился V.  $15:30 = 12:24$

Изъ 2<sup>й</sup> ————— VI.  $24:30 = 12:15$

Изъ 3<sup>й</sup> ————— VII.  $12:24 = 15:30$

Изъ 4<sup>й</sup> ————— VIII.  $12:15 = 24:30$ .

### § 128. О непрерывной кратной пропорціи.

Въ кратной пропорціи, такъ какъ въ разностной, средніе члены могутъ быть равны; на примѣръ:

$$3:7 = 7:16\frac{1}{2}.$$

Въ такомъ случаѣ кратная пропорція также называется *непрерывною*, а каждый изъ среднихъ членовъ *среднимъ кратнымъ числомъ* (или среднимъ геометрическимъ числомъ.)

Правила, выведенныя для кратной пропорціи вообще, могутъ быть всѣ примѣнены и къ непрерывной кратной пропорціи.

§ 129. О сложной кратной пропорции.

I. Если сходственные члены двухъ или болѣе пропорцій, имѣющихъ одинакихъ знаменателей, будутъ сложены, то суммы ихъ также составятъ пропорцію.

Пусть будутъ данныя кратныя пропорціи :

$$\begin{array}{r} 12 : 8 = 9 : 6 \\ 18 : 12 = 3 : 2 \\ \hline 30 : 20 = 12 : 8 \end{array}$$

Сложивъ сходственные члены, получимъ два сложные отношенія, коихъ знаменатели равны, ибо (§ 118) равны знаменателямъ отношеній первой пропорціи; а изъ сего слѣдуетъ, что изъ оныхъ можно составить пропорцію.

II. Если сходственные члены двухъ или болѣе кратныхъ пропорцій будутъ умножены, то произведенія ихъ также составятъ пропорцію.

Пусть будутъ даны кратныя пропорціи:

$$\begin{array}{r} 3 : 5 = 9 : 15 \\ 8 : 2 = 20 : 5 \\ \hline 24 : 10 = 180 : 75. \end{array}$$

Знаменатель перваго сложнаго кратнаго отношенія равенъ произведенію изъ знаменателей данныхъ кратныхъ отношеній (§ 118);

также знаменатель второго сложнаго отношенія равенъ таковому же произведенію; слѣд. они равны; а посему изъ сложныхъ отношеній можно составить пропорцію.

Пропорціи, составленныя изъ суммъ или произведеній сходственныхъ членовъ двухъ или болѣе крапныхъ пропорцій, называются *сложными*.

### § 130. О видоизмѣненіяхъ кратной пропорціи

Если въ какой нибудь крапной пропорціи:

$$7 : 3 = 21 : 9$$

къ предъидущимъ членамъ придадутся послѣдующіе, то составится новая пропорція:

$$7 + 3 : 3 = 21 + 9 : 9,$$

или  $10 : 3 = 30 : 9 ;$

ибо, придавъ къ первому члену перваго отношенія второй членъ, увеличиваемъ знаменатель перваго отношенія единицею, поелику второй членъ долженъ въ суммѣ содержать единицею болѣе разъ. По той же причинѣ и знаменатель второго отношенія увеличится единицею; слѣд. отношенія останутся равными, и посему составятъ пропорцію.

И такъ I. Сумма членовъ перваго отношенія относится ко второму члену того же отношенія, какъ сумма членовъ



*второго отношенія относится ко второму члену тогоже отношенія.*

Переставивъ среднїе члены производной новой пропорціи (§ 127, II) получимъ:

$$7 + 3 : 21 + 9 = 3 : 9,$$

*т. е. II. сумма членовъ перваго отношенія относится къ суммѣ членовъ втораго, какъ второй членъ перваго относится ко второму члену втораго.*

Если въ данной пропорціи изъ предъидущихъ членовъ вычтутся послѣдующіе, то составившаяся новая пропорція:

$$7 - 3 : 3 = 21 - 9 : 9.$$

Отнявъ отъ перваго члена перваго отношенія второй членъ, уменьшимъ знаменателя единицею: ибо второй членъ долженъ въ разности содержаться однимъ разомъ менѣе. По той же причинѣ и во второмъ отношеніи знаменатель уменьшится единицею; слѣд. отношенія останутся равными, и посему изъ оныхъ можно составить пропорцію.

*И такъ III. разность членовъ перваго отношенія относится ко второму члену того же отношенія, какъ разность членовъ втораго отношенія ко второму члену тогоже отношенія.*

Переставивъ въ послѣдней пропорціи среднїе члены, получимъ:

*Арх. Ч. II.*

$$7 - 3 : 21 - 9 = 3 : 9,$$

т. е., IV. разность членовъ перваго относится къ разности членовъ втораго, какъ второй членъ перваго отношенія ко второму втораго.

Сравнивъ вторую и четвертую пропорціи:

$$7 + 3 : 21 + 9 = 3 : 9.$$

$$7 - 3 : 21 - 9 = 3 : 9.$$

увидимъ, что V. сумма членовъ перваго отношенія относится къ суммѣ членовъ втораго, какъ разность членовъ перваго отношенія относится къ разности членовъ втораго; потому что оба отношенія равны одному и тому же прѣпъему, а именно: отношенію между послѣдующими членами.

И такъ

$$7 + 3 : 21 + 9 = 7 - 3 : 21 - 9.$$

Переставивъ въ сей послѣдней пропорціи средніе члены, получимъ:

$$7 + 3 : 7 - 3 = 21 + 9 : 21 - 9;$$

слѣд. VI. сумма членовъ перваго отношенія относится къ ихъ разности, какъ сумма членовъ втораго отношенія къ разности между оными.

Примѣчаніе. Краткая пропорція имѣетъ весьма много подобныхъ видоизмѣненій. Здѣсь показаны только тѣ, которыя въ послѣдствіи необходимо будутъ нужны.

## ОТДѢЛЕНИЕ V.

### О ТРОЙНЫХЪ ПРАВИЛАХЪ.

#### ГЛАВА I.

##### ПРОСТОЕ ТРОЙНОЕ ПРАВИЛО.

§. 131. *О составленіи кратной пропорціи изъ условій данной задачи.*

Въ послѣдней главѣ были изслѣдованы нѣкоторыя свойства кратной пропорціи; теперь надлежитъ узнать, какимъ образомъ оныя примѣняются къ рѣшенію задачъ, въ общезнѣшій часто встрѣчающихся.

Задача. 5 аршинъ сукна куплено за 45 рублей; спрашивается сколько слѣдуетъ заплатить за 16 аршинъ.

Для удобнѣйшаго соображенія данныя числа могутъ быть написаны въ слѣдующемъ видѣ:

5 аршинъ 45 руб.

16 аршинъ  $x$  руб.

Чтобъ найти цѣну 16 аршинъ, надлежитъ сперва узнать цѣну одного; одинъ аршинъ въ 5 разъ менѣе стоить нежели 5 аршинъ: и такъ должно цѣну 5 аршинъ, *т. е.*, 45 руб.



раздѣлить на 5, и частное, 9 руб., будетъ искомое число. Если 1 аршинъ стоишь 9 руб.; то за 16 аршинъ должно заплатить въ 16 разъ болѣе; слѣд. надлежитъ 9 руб. умножить на 16, и найденное произведеніе 144 руб. должно быть искомымъ числомъ.

Сіе число можно найти еще другимъ образомъ. За 5 аршинъ заплачено 45 руб.; слѣд. за 16 аршинъ должно заплатить болѣе, и во сколько разъ болѣе, во сколько 16 аршинъ болѣе 5 аршинъ. 16 аршинъ болѣе 5 аршинъ въ  $3\frac{1}{5}$  раза; слѣд. надлежитъ 45 руб. умножить на  $3\frac{1}{5}$ , и найденное произведеніе 144 руб. будетъ искомая цѣна 16 аршинамъ.

Сія рѣшенія просты и ясны, но не всегда удобны для выкладки, по причинѣ большихъ дробей, которыя могутъ всмрѣчаться.

Положимъ, что нѣкто въ 47 часовъ проѣзжаетъ 483 версты; сколько верстъ проѣдетъ въ 67 часовъ, если будетъ ѣхать съ такою же скоростью?

Узнаемъ сперва, сколько верстъ путешественникъ проѣзжаетъ въ 1 часъ. Для сего должно 483 раздѣлить на 47, и частное,  $\frac{483}{47} = 10\frac{1}{47}$ , покажемъ, сколько верстъ онъ проѣзжаетъ въ 1 часъ. Умноживъ  $10\frac{1}{47}$  верстъ на 67, получимъ  $683\frac{1}{47}$ , и сіе число верстъ будетъ искомое.

Подобныя же затрудненія встрѣиваясь и при второмъ способѣ, ибо 47 не содержишь цѣлое число разъ въ 67.

Въ таковыхъ случаяхъ кратная пропорція доставляетъ большое облегченіе. Разсмотримъ, какимъ образомъ она можетъ быть примѣнена къ рѣшенію сей задачи.

Очевидно, что въ большее число часовъ путешественникъ пройдетъ большее число верстъ, и во сколько разъ болѣе, во сколько 67 болѣе 47; слѣд. искомое число верстъ должно быть болѣе 483. верстъ во сколько разъ, во сколько 67 болѣе 47; и такъ

$$x^в : 483^в = 67^ч : 47^ч$$

$$\text{слѣд. (§ 125)} \quad x = \frac{483 \times 67}{47} = 688 \frac{2}{7} \text{ вер.}$$

Дѣйствіе сіе предсказывается въ слѣдующемъ видѣ:

$$\begin{array}{r}
 x^в : 483^в = 67^ч : 47^ч \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 67 \\
 3381 \\
 2898 \\
 \hline
 32351 \quad | \quad 47 \\
 282 \quad | \quad 688 \\
 \hline
 416 \\
 376 \\
 \hline
 401 \\
 376 \\
 \hline
 25
 \end{array}
 \end{array}$$

И такъ  $x = 688\frac{3}{4}$  вершамъ.

Если члены пропорціи сокращаются (§ 126), то сіе должно непременно сдѣлать, ибо чрезъ такое сокращеніе выкладки облегчаются.

Задача. Куплено 140 аршинъ холста за 255 руб.; сколько должно заплатить за 287 аршинъ холста такой же доброты?

Разбирая сію задачу, какъ предъидущую, можно изъ оной составить слѣдующую пропорцію.

$$x^p : 255^{руб.} = 287^{ар.} : 140^{ар.}$$

По сокращеніи 2<sup>го</sup> и 4<sup>го</sup> членовъ на 5 будетъ:

$$x : 51 = 287 : 28.$$

По сокращеніи 3<sup>го</sup> и 4<sup>го</sup> членовъ на 7 получится пропорція:

$$x : 51 = 41 : 4.$$

$$\text{слѣд. } x = \frac{51 \times 41}{4} = 522\frac{3}{4} \text{ руб.}$$

Примѣчаніе. Нѣтъ необходимости переписывать пропорціи; сокращеніе сіе представляется въ слѣдующемъ видѣ:

$$\begin{array}{ccc} 51 & 41 & 28 \\ x : 287 = 287 : 140 \end{array}$$

### § 132. Опредѣленіе тройнаго правила.

Во всѣхъ задачахъ, рѣшенныхъ въ предъидущемъ параграфѣ, находилось при извѣстныхъ числа, изъ коихъ два одного рода, а третье



другаго рода; требовалось найти четвертое; одного рода съ третьимъ, и составляющее съ онымъ отношеніе, равное отношенію первыхъ двухъ чиселъ. Правило, по которому рѣшаются подобныя задачи, т. е., приискивается къ даннымъ тремъ четвертое пропорціональное число, называется *тройнымъ*.

Во всѣхъ задачахъ неизвѣстное число, составлявшее первый членъ перваго отношенія, соотвѣтствовало первому члену втораго отношенія, а однородный съ онымъ второй членъ перваго отношенія соотвѣтствовалъ второму члену втораго отношенія.

Обяснимъ сіе примѣромъ. Въ 1ой задачѣ искомое число рублей соотвѣтствовало числу аршинъ (16 аршинъ), которые на оныя деньги должно было купить, точно такъ, какъ второй членъ перваго отношенія (45 руб.) соотвѣтствовалъ 2<sup>му</sup> члену втораго отношенія (9 аршинъ).

Изъ сего явствуетъ, что въ сей задачѣ неизвѣстное число и извѣстное тогоже рода находятся въ прямомъ отношеніи съ прочими двумя данными числами; но это не всегда бываетъ.

Задача. На пару платья потребно  $4\frac{1}{2}$  аршина, шириною въ  $1\frac{1}{2}$  ар.; сколько нужно имѣть сукна шириною въ  $2\frac{1}{2}$  аршина на такое же платье?

Очевидно, чѣмъ шире сукно, тѣмъ менѣе нужно онаго имѣнн, и во сколько разъ менѣе, во сколько оно шире: изъ сего слѣдуетъ, что неизвѣстное число во сколько разъ менѣе  $4\frac{1}{2}$  аршинъ, во сколько  $2\frac{1}{8}$  ар. болѣе  $1\frac{7}{8}$  ар., или, что все равно, во сколько  $1\frac{7}{8}$  менѣе  $2\frac{1}{8}$ . И такъ

$$x^{\text{ар.}} : 1\frac{7}{8}^{\text{ар.}} = 1\frac{7}{8}^{\text{ар.}} : 2\frac{1}{8}^{\text{ар.}}$$

по умноженіи 3<sup>го</sup> и 4<sup>го</sup> членовъ на 8, будетъ:

$$x : 1\frac{7}{8} = 15 : 17.$$

По сокращеніи 2<sup>го</sup> и 4<sup>го</sup> членовъ на 17, получимъ:

$$x : \frac{1}{2} = 15 : 1$$

И такъ  $x = 15 \times \frac{1}{2} = \frac{15}{2} = 3\frac{3}{2}$  аршинамъ.

Въ семь примѣрѣхъ неизвѣстное число и неизвѣстное того же рода находяпся съ прочими числами въ обратномъ отношеніи.

### § 133. Правила для составленія кратной пропорціи изъ чиселъ данной задачи.

Изъ предъидущихъ параграфовъ можно вывести слѣдующія правила для рѣшенія подобныхъ задачъ.

1. Сперва должно написать задачу, для удобнѣйшаго обозрѣнія такъ, чтобъ числа одного рода были помѣщены одно подъ другимъ.

II. Надлежитъ разсмотрѣть, находится ли неизвѣстное число и извѣстное того же рода, въ прямомъ или обратномъ отношеніи съ прочими двумя данными числами.

III. Въ одномъ отношеніи могутъ быть поимѣняемы только числа одного рода.

IV. Нашедши два равныя отношенія, должно составить изъ оныхъ кратную пропорцію.

V. Наконецъ, надлежитъ опредѣлять искомый членъ по вышеизложеннымъ правиламъ (§ 125).

#### § 134. Раздѣленіе тройнаго правила на простое и сложное.

Въ предъидущихъ задачахъ неизвѣстное число зависѣло отъ трехъ данныхъ чиселъ, изъ коихъ два одного рода, а шрестіе однородное съ неизвѣстнымъ. Иногда же случается, что искомое число зависить отъ большаго числа извѣстныхъ чиселъ. На примѣръ: 20 работниковъ въ 5 дней выработали 175 рублей; сколько должны получить 40 работниковъ въ 15 дней. Здѣсь неизвѣстное число рублей зависить отъ двухъ чиселъ работниковъ, отъ двухъ чиселъ дней и отъ одного числа рублей, слѣд. отъ 5 чиселъ.



Въ данной задачѣ можно присоедииить еще одно условіе, на прим. полагая что ежедневная работа была различна, т. е. пусть первые работники ежедневно по 12 часовъ, а послѣдніе только по 9 часовъ. Въ такомъ случаѣ неизвѣстное число рублей зависить отъ двухъ чиселъ работниковъ, отъ 2 чиселъ дней, 2 чиселъ часовъ и одного числа рублей. И такъ неизвѣстное число можетъ зависѣть отъ 3, 5, 7 и болѣе данныхъ чиселъ, если прибавятся еще какія нибудь новыя условія, и на семь различій основывается раздѣленіе тройнаго правила на *простое* и *сложное*.

Если неизвѣстное число зависить отъ 3 чиселъ, то въ такомъ случаѣ правило, по которому задача рѣшается, называется *простымъ тройнымъ правиломъ*; если же неизвѣстное число зависить отъ 5, 7 и т. д. данныхъ чиселъ, то правило, по которому опредѣляется искомое число, называется *Сложнымъ тройнымъ правиломъ*.

## ГЛАВА II.

## СЛОЖНОЕ ТРОЙНОЕ ПРАВИЛО.

§ 135. Сложное тройное правило, зависящее отъ 5 данныхъ чиселъ.

Задача. Съ 2500 рублей получено въ 10 мѣсяцевъ 250 руб. прибыли: сколько должно получить прибыли съ 4000 руб. въ 7 мѣсяцевъ?

2500 руб. 10 мѣсяц. 350 руб.

4000 руб. 7 мѣсяц.  $x$  руб.

Положимъ, что 4000 руб. находились въ оборотѣ также 10 мѣсяцевъ, то съ оной суммы получили бы прибыли болѣе 350 руб., и во столько разъ болѣе, во сколько 4000 руб. болѣе 2500 руб.; слѣд.

$$x^p : 350^p = 4000^p : 2500^p$$

$$\text{и } x = 70 \times 8 = 560 \text{ руб.}$$

И такъ съ 4000 руб. должно получить въ 10 мѣсяцевъ прибыли 560 руб.; но какъ 4000 руб. были въ оборотѣ только 7 мѣсяцевъ, а не 10, то и прибыль должна быть менѣе 560 руб., и во столько разъ менѣе, во сколько 7 менѣе 10; слѣд.

$$x^p : 56^p =^m 7 : 10^m$$

$$\text{и } x = 56 \times 7 = 392 \text{ руб.}$$

Надлежитъ замѣнить, что въ сей задачѣ отношеніе между неизвѣстнымъ числомъ и извѣстнымъ того же рода, находится въ прямомъ отношеніи съ прочими числами; ибо во сколько разъ болѣе капиталъ, во столько же разъ и прибыль должна быть болѣе, и во сколько разъ время уменьшается, во столько же разъ и прибыль должна уменьшаться.

Въ слѣдующей задачѣ легко замѣнить, что неизвѣстное число съ извѣстнымъ того же рода находится въ обратномъ отношеніи съ прочими числами.

*Задача. 500 работниковъ вырыли извѣстной величины ровъ въ 4 мѣсяца, работая ежедневно по 12 часовъ; во сколько мѣсяцевъ выкопютъ такой же ровъ 200 работниковъ, работая ежедневно по 7½ часовъ?*

Положимъ, что послѣдніе работники занимаются ежедневно работою тоже 12 часовъ, то имъ нужно имѣть болѣе времени, потому что ихъ менѣе; и во сколько разъ болѣе 4 мѣсяцевъ, во сколько 200 менѣе 500, или во сколько 500 болѣе 200; слѣд.

$$x^m : 4^m = 500^p : 200^p$$

$$x = 2 \times 5 = 10 \text{ мѣсяцамъ.}$$



Но се найденное число мѣсяцевъ не будетъ искомымъ, ибо полагали, что послѣдніе работники занимающіеся работою ежедневно по 12 часовъ; но они работаютъ только по  $7\frac{1}{2}$  часовъ; слѣд. имъ надобно имѣть еще болѣе времени, и именно во столько разъ, во сколько 12 болѣе  $7\frac{1}{2}$ . И такъ.

$$x^m : 10^m = 12^7 : 7\frac{1}{2}^7$$

$$\begin{array}{ccccc} & 2 & 4 & \frac{1}{2} & \\ & & & & \\ \text{или } x : 10 & = & 12 : 7\frac{1}{2} \end{array}$$

$$\text{и } x = 2 \times 4 : \frac{1}{2} = 8 : \frac{1}{2} = 16 \text{ мѣсяцамъ.}$$

Въ сей задачѣ отношеніе между неизвѣстнымъ числомъ дней и извѣстнымъ зависѣло отъ двухъ обратныхъ отношеній, ибо чѣмъ менѣе работниковъ и чѣмъ менѣе часовъ они ежедневно работаютъ, тѣмъ большее число мѣсяцевъ должно быть употреблено на окончаніе той же работы.

§ 136. Сложное тройное правило, зависящее отъ 7 данныхъ чиселъ.

Рѣшеніе задачъ, въ коихъ неизвѣстное число зависитъ отъ 7, 9 и ш. д. чиселъ совершенно подобно предъидущимъ, съ тѣмъ только различіемъ, что составляется большее число простыхъ тройныхъ правилъ.

25 учениковъ могутъ въ 12 дней написать 2700 страницъ, на каждой по 28 строкъ; во сколько дней напишутъ 35

учениковъ 3600 страницъ, если на каждой должно быть 20 строкъ.

25 учен. 12 дней 2700 стран. 28 строкъ

35 ——— x ——— 3600 ——— 20 ———

Положимъ, что послѣдніе ученики должны также написать 2700 страницъ, и на каждой страницѣ 28 строкъ, но имъ, поелику ихъ болѣе, нужно имѣть менѣе времени, и во столько разъ менѣе, во сколько 35 болѣе 25, или 25 менѣе 35, и такъ

$$x : 12 = \overset{А}{25}^{\overset{А}{12}} = \overset{5}{25}^{\overset{7}{12}} \text{ уч.} : \overset{7}{25}^{\overset{5}{12}} \text{ уч.}$$

$$x = \frac{12 \times 5}{7} = \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7} \text{ днямъ.}$$

слѣд. 35 учениковъ должны употребить  $8\frac{4}{7}$  дней, чтобы написать 2700 страницъ, по 28 строкъ на каждой; но они должны написать 3600 страницъ; слѣд. имъ надобно имѣть болѣе времени, и во сколько разъ болѣе, во сколько 3600 болѣе 2700; слѣд.

$$x : 8\frac{4}{7} = \overset{А}{3600}^{\overset{А}{8\frac{4}{7}}} = \overset{4}{3600}^{\overset{4}{8\frac{4}{7}}} \text{ стр.} : \overset{3}{2700}^{\overset{3}{8\frac{4}{7}}} \text{ стр.}$$

$$x = \frac{8\frac{4}{7} \times 4}{3} = \frac{60 \times 4}{7 \times 3} = \frac{240}{21} = 11\frac{2}{7} \text{ дн.}$$

И такъ 35 учениковъ напишутъ въ  $11\frac{2}{7}$  дней 3600 страницъ, и по 28 строкъ на каждой; но имъ слѣдуетъ написать на каждой страницѣ только 20 строкъ; и по сему имъ нужно менѣе времени, и во сколько разъ менѣе, во сколько 20 менѣе 28; слѣд.

$$x^A : 11\frac{2}{7}^A = 20^{\text{спр.}} : 28^{\text{спр.}}$$

$$\text{или } x : \frac{80}{7} = 20^6 : 28^7$$

$$x = \frac{80}{7} \times \frac{6}{7} = \frac{480}{49} = 8\frac{8}{49} \text{ дней.}$$

И такъ 35 учениковъ кончатъ заданную работу въ  $8\frac{8}{49}$  дней.

### § 137. Сокращенный способъ рѣшенія сложныхъ тройныхъ правилъ.

Можно рѣшить послѣднюю задачу еще другимъ сокращеннымъ способомъ. Для сего надлежитъ, какъ выше показано, сперва положить, что послѣдніе ученики должны кончить такую же работу, и въ такомъ случаѣ имъ нужно имѣть менѣе времени и во столько разъ менѣе, во сколько 35 болѣе 25; и такъ

$$x^A : 12^A = 25^{\text{уч.}} : 35^{\text{уч.}}$$

$$\text{слѣд. } x = \frac{12 \times 25}{35} \text{ днямъ.}$$

Здѣсь не нужно искать, какому числу равенъ  $x$ , но только означить посредствомъ надлежащихъ знаковъ, какія дѣйствія должны быть произведены для опредѣленія онаго. Найденное дробное число не будетъ искомымъ, потому что между прочими условіями было положено, что послѣдніе ученики пишутъ только 2700 страницъ, но они должны написать 3600 страницъ; слѣд. имъ надобно имѣть болѣе времени и во столько разъ болѣе во сколько 3600 болѣе 2700. И такъ



$$x'^A : \frac{12 \times 25^A}{35} = 3600 \text{ стр.} : 2700 \text{ стр.}$$

$$\text{и } x^I = \frac{12 \times 25 \times 3600}{35 \times 2700} \text{ дн. (§ 86 и § 91).}$$

Между прочими условіями было положено, что послѣдніе ученики пишутъ по 28 строкъ на страницѣ; но имъ должно только писать по 20 строкъ; слѣд. имъ не нужно имѣть столько времени, сколько означено найденнымъ дробнымъ числомъ, но менѣе, и во столько разъ менѣе, во сколько 20 менѣе 28; слѣд.

$$x''^A : \frac{12 \times 25 \times 3600^A}{35 \times 2700} = 20 \text{ стр.} : 28 \text{ стр.}$$

$$\text{и } x'' = \frac{12 \times 25 \times 3600 \times 20}{35 \times 2700 \times 28} \text{ дней.}$$

Извѣстно, что величина дроби не измѣнится, если ея числитель и знаменатель раздѣлятся на одно и то же число, посему можно въ полученномъ дробномъ числѣ уничтожить равныхъ множителей въ числелѣ и знаменателѣ; слѣд.

$$x'' = \frac{\overset{4}{12} \times \overset{4}{25} \times \overset{4}{3600} \times \overset{5}{20}}{\underset{7}{35} \times \underset{8}{2700} \times \underset{7}{28}} = \frac{400}{50} = 8 \frac{4}{5} \text{ дн.}$$

Разсмотримъ теперь дробное выраженіе, равное искомому числу.

$$x = \frac{12 \times 25 \times 3600 \times 20}{35 \times 2700 \times 28}$$

Оное можно разложить на 2 множителя, изъ коихъ первый будетъ цѣлое число 12, а другой дробное выраженіе  $\frac{25 \times 3600 \times 20}{35 \times 2700 \times 28}$ . Сіе послѣднее можно также разложить на множители  $\frac{25}{35} \times \frac{3600}{2700} \times \frac{20}{28}$ ; и такъ

$$x = 12 \times \frac{25}{35} \times \frac{3600}{2700} \times \frac{20}{28}$$

Число 12 есть число, однородное съ неизвѣстнымъ; дробь  $\frac{25}{35}$  означаетъ знаменателя обратнаго отношенія между данными числами учениковъ; дробь  $\frac{3600}{2700}$  есть знаменатель прямого отношенія между данными числами спрашицъ; а  $\frac{20}{28}$  есть знаменатель прямого отношенія между данными числами спрокъ.

И такъ неизвѣстное число равно извѣстному числу того же рода, умноженному на всѣхъ знаменателей отношенія между прочими однородными числами.

Задача. Въ Лондонѣ куплено товару на 1000 фунтовъ стерлинговъ; спрашивается сколько рублей ассигнаціями должно заплатить за оный товаръ, если 5 фун. стер. = 33 талерамъ прусскимъ; 25 талеровъ прус. = 24 рублям. сереб.; 1 рубль сереб. = 372 коп.?

Риш. Ч. II.

Рѣшеніе. Очевидно, что при данныхъ отношеніяхъ 1000 фунт. стерл. не можно перевести на російскія деньги, не узнавъ сперва сколько талеровъ прусск. содержится въ оной суммѣ. Талеровъ прусскихъ должно быть болѣе, и именно во сколько разъ 33 болѣе 5; слѣд.

$$x = \frac{1000 \times 33}{5}.$$

Сіе число талеровъ прусск. должно быть опредѣлено въ рубляхъ серебр. Сихъ послѣднихъ будетъ менѣе, и во столько разъ, во сколько 24 менѣе 25; и такъ

$$x' = \frac{1000 \times 33 \times 24}{5 \times 25}.$$

Въ 1 руб. серебр. 372 коп., и такъ, чтобъ опредѣлить сколько копѣекъ заключается въ 1000 ф. стерл., надлежитъ найденное число умножить на 372 (§ 86); слѣд.

$$x'' = \frac{1000 \times 33 \times 24 \times 372}{5 \times 25}.$$

Сдѣлавъ надлежащее сокращеніе, и перемноживъ всѣхъ множителей, найдемъ что

$$|x'' = 2356992 \text{ коп. или } 23569 \text{ руб. } 92. \text{ коп.}$$



## ГЛАВА III.

ПРАВИЛА, ОСНОВАННЫЯ НА ТРОЙНОМЪ ПРАВИЛѢ.

## § 138. Правило товарищества.

Задача 1<sup>я</sup>. Три купца торговали вмѣстѣ и получили прибыли 15,600 руб. Первый внесъ для торгу 30,000 руб., второй 37,500 руб., а третій 22,500 руб.; требуется знать, сколько каждый получитъ изъ общей прибыли?

Поселику общая прибыль 15.600 руб. получена на общій ихъ капиталъ, посему должно сперва найти сумму ихъ капиталовъ:

$$\begin{array}{r}
 30,000 \text{ руб.} \\
 37,500 \text{ —} \\
 22,500 \text{ —} \\
 \hline
 90,000 \text{ руб.}
 \end{array}$$

Прибыль первого должна быть менѣ общей, и во сколько разъ, во сколько его капиталъ менѣ общаго капитала;

$$\begin{aligned}
 \text{слѣд. } x^p : 15,600^p &= \frac{1}{3}, 000^p : 90,000^p, \\
 \text{и } x &= \frac{15600}{3} = 5,200 \text{ руб.}
 \end{aligned}$$

Прибыль второго также должна быть менѣ общей, и во столько разъ, во сколько его капиталъ менѣ общаго капитала; слѣд.

$$x^p : 15,600^p = 125^p : 9000^p,$$

и  $x = 52 \times 125 = 6500$ .

Прибыль третьяго должна также относиться къ общей прибыли, какъ капиталъ третьяго къ общему капиталу:

$$x^p : 15600^p = 25^p : 9000^p,$$

и  $x = 156 \times 25 = 3900$ .

Если задача вѣрно рѣшена, то найденныя частныя прибыли, вмѣстѣ взятныя, должны составлять общую прибыль.

Прибыль первого 5200 руб.

———— второго 6500 ———

———— третьяго 3900 ———

15600 руб.

Цѣль рѣшенія сей задачи состояла въ томъ, чтобъ раздѣлить общую прибыль (15600 р.) на части, пропорціональныя частнымъ вкладамъ.

Правило, по которому рѣшаются подобныя задачи, называется *правиломъ Товарищества* или *правиломъ пропорціональнаго дѣленія*. И такъ правило товарищества есть такое, по которому одно число дѣ-

лится на части, пропорціональныя другимъ даннымъ числамъ.

Для рѣшенія задачъ по сему правилу должно наблюдать слѣдующее:

I. Сложить числа, пропорціонально которымъ требуется раздѣлить одно изъ данныхъ чиселъ.

II. Для опредѣленія первой части надлежитъ составить пропорцію: искомая первая часть относится ко всему числу, какъ соотвѣтствующее оной части число къ найденной суммѣ.

III. Для опредѣленія второй и прочихъ частей должно составлять подобныя пропорціи.

Прибавимъ къ предъидущей задачѣ новое условіе, и рассмотримъ, какимъ образомъ она рѣшается въ такомъ случаѣ.

Задача 2<sup>я</sup>. Тремъ плотникамъ заплачено 480 рублей. Первый работалъ 60 дней, и ежедневно по 6 часовъ; второй 40 дней по 8 часовъ, а третій 10 дней по 12 часовъ; спрашивается, сколько долженъ каждый получить, если имъ будетъ произведена плата, соразмѣрная времени, ими на работу употребленному?

Здѣсь частная плата не можетъ быть пропорціональна числу дней, потому что



плошники не одинаковое число часовъ работали въ день. И такъ должно сперва узнать, сколько часовъ каждый работалъ, и потомъ уже поступать по правиламъ, введеннымъ изъ рѣшенія первой задачи.

|                |                                           |          |
|----------------|-------------------------------------------|----------|
| 1 <sup>й</sup> | работалъ 60 дней по 6 часовъ или 360 час. |          |
| 2 <sup>й</sup> | ————— 40 ————— 8 ————— 320 ———            |          |
| 3 <sup>й</sup> | ————— 10 ————— 12 ————— 120 ———           |          |
|                |                                           | 800 час. |

$$x : \frac{6}{4} \text{ р} = 360^{\text{ч}} : 800^{\text{ч}}$$

$$\text{и } x = 6 \times 36 = 216 \text{ руб. — плата } 1^{\text{го}}$$

$$x' : \frac{6}{4} \text{ р} = 320^{\text{ч}} : 800^{\text{ч}}$$

$$\text{слѣд. } x' = 6 \times 32 = 192 \text{ руб. — плата } 2^{\text{го}}$$

$$x'' : \frac{6}{4} \text{ р} = 120^{\text{ч}} : 800^{\text{ч}}$$

$$\text{слѣд. } x'' = 6 \times 12 = 72 \text{ руб. — плата } 3^{\text{го}}$$

Сумма найденныхъ чиселъ должна быть равна данному числу.

$$\begin{array}{r} 216 \text{ рублей} \\ 192 \text{ ———} \\ 72 \text{ ———} \\ \hline 480 \text{ рублей} \end{array}$$

Задача 3<sup>я</sup>. Для нѣкотораго дѣла употреблены 3 работника, изъ коихъ 1<sup>й</sup> окончилъ бы оное въ 12 дней, работая въ день

по 10 часовъ; 2<sup>я</sup> въ 15 дней, еслибы удв-  
лялъ въ день по 6 часовъ; 3<sup>я</sup> въ 9 дней,  
занимаясь ежедневно по 8 часовъ; спра-  
шивается: 1°, во сколько времени сіи три  
работника, работая вмѣстѣ, окончатъ  
то дѣло; 2°, какую часть онаго сдѣлаетъ  
каждый; и 3°, сколько каждый заработаетъ,  
когда за всю работу должно заплатить  
108 рублей.

Рѣшеніе. I. Первый оканчиваетъ все дѣло  
въ 12 дней, работая въ день по 10 часовъ,  
т. е. во 120 часовъ; слѣд. въ 1 часъ можетъ  
онъ сдѣлать только  $\frac{1}{120}$  всего дѣла; 2<sup>я</sup> упо-  
требляетъ на всю работу  $15 \times 6$  или 90 ча-  
совъ, слѣд. въ 1 часъ можетъ онъ произве-  
сти только  $\frac{1}{90}$  всей работы; а 3<sup>я</sup>, которо-  
му нужно 9 разъ 8 часовъ, или 72 часа, на про-  
изводство всей работы, въ 1 часъ сдѣлаетъ  $\frac{1}{72}$ .

И такъ всѣ трое вмѣстѣ въ одинъ часъ  
сдѣлаютъ  $\frac{1}{120} + \frac{1}{90} + \frac{1}{72}$  всей работы, но  $\frac{1}{120} + \frac{1}{90}$   
 $+ \frac{1}{72} = \frac{3}{360} + \frac{4}{360} + \frac{5}{360} = \frac{12}{360} = \frac{1}{30}$ ; слѣд. въ 1 часъ  
всѣ 3 работника могутъ произвести  $\frac{1}{30}$  всей  
работы; изъ сего явствуетъ, что на все  
дѣло должно имъ имѣть въ 30 разъ болѣе вре-  
мени, т. е. 30 часовъ.

II. Теперь найдемъ, какую часть работы  
каждый сдѣлаетъ:

1<sup>й</sup> въ 1 часъ дѣлаетъ  $\frac{1}{120}$  работы; слѣд. въ 30 часовъ,  $30 \times \frac{1}{120}$  или  $\frac{30}{120}$  или  $\frac{1}{4}$ .

2<sup>й</sup> въ 1 часъ производитъ  $\frac{1}{90}$  работы; слѣд. въ 30 часовъ,  $30 \times \frac{1}{90}$  или  $\frac{30}{90}$  или  $\frac{1}{3}$ .

3<sup>й</sup> въ 1 часъ можетъ сдѣлать  $\frac{1}{72}$  всего дѣла; слѣд. въ 30 часовъ  $30 \times \frac{1}{72}$  или  $\frac{30}{72}$  или  $\frac{5}{12}$ .

Сложивъ  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$  и  $\frac{5}{12}$ , получимъ  $\frac{3}{12} + \frac{4}{12} + \frac{5}{12}$  или  $\frac{12}{12}$  или 1; изъ сего слѣдуетъ, что рѣшеніе сіе вѣрно.

III. Остается только раздѣлить между ими 108 руб., пропорціонально ихъ работѣ. Первый, сдѣлавшій  $\frac{1}{4}$  всей работы долженъ получить четверть 108 руб., т. е. 27 руб.; второй, произведшій  $\frac{1}{3}$  всей работы, долженъ имѣть треть 108 руб. или 36 руб.; третій, который сдѣлалъ  $\frac{5}{12}$  всей работы, заработалъ  $\frac{5}{12}$  отъ 108 или 45 руб. Сложивъ 27 руб., 36. руб. и 45 руб., получимъ всю сумму 108 руб., чѣмъ и доказывается справедливость рѣшенія.

### § 139. Правило смѣшенія.

Задача. Сдѣлано смѣшеніе изъ трехъ сортовъ чаю. Для онаго взято 3 фунта по 15<sup>ти</sup> руб., 5 фунтовъ по 9 руб., и 10 фунтовъ по 7 руб. за фунтъ; спрашивается, чего долженъ стоить фунтъ смѣшаннаго чаю?

Чтобъ узнать сіе, надлежитъ сперва узнать, чего стоить все количество чаю.



|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 3 фунта по 15 руб. сплуютъ 15 р. $\times$ 3 или 45 руб. |          |
| 5 ————— 9 ————— 9 р. $\times$ 5 ——— 45 ———              |          |
| 10 ————— 7 ————— 7 р. $\times$ 10 ——— 70 ———            |          |
| 18 фунтовъ                                              | 160 руб. |

И такъ все количество чаю сплуютъ 160 руб.; всего же смѣшаннаго чаю 18 фунт.; слѣд., чтобы найти цѣну одного фунта смѣшаннаго чаю, надлежитъ только 160 раздѣлить на 18; ибо 1 фунтъ сплуетъ въ 18 разъ менѣе 18<sup>ти</sup> фунтовъ.

$$\begin{array}{r|l} 160 & 18 \\ 144 & 8\frac{10}{18} \\ \hline & 16 \end{array}$$

И такъ одинъ фунтъ смѣшаннаго чаю сплуетъ 8 $\frac{10}{18}$ , руб., или 8 руб. 88 $\frac{2}{3}$  коп. Правило, по которому рѣшаются подобныя задачи, называется *правиломъ смѣшенія*. И такъ, какъ явствуетъ изъ рѣшенія задачи, *правило смѣшенія есть способъ опредѣлять цѣну извѣстной мѣры какого нибудь смѣшенія, зная цѣну вещей оное составляющихъ*.

Чтобы опредѣлить цѣну извѣстнаго количества какого нибудь смѣшенія, зная количество и цѣну каждаго рода вещей, оное составляющихъ, должно:

I. Узнать сумму вещей и цѣну оныхъ.

II. Раздѣлить второе число на первое, и найденное частное будетъ искомое число.

Рѣшимъ задачу другаго рода, относящуюся также къ правилу смѣшенія.

Изъ двухъ сортовъ пороха, изъ коихъ перваго сорта фунтъ стоитъ 85 коп., а втораго 69 коп., требуется сдѣлать смѣшеніе, состоящее изъ 10 фунтовъ такъ, чтобъ фунтъ смѣшаннаго пороха стоилъ 73 копейки.

По условію самой задачи, въ смѣшеніи должны находиться порохъ обѣихъ цѣнъ; слѣд. требуется опредѣлить, въ какомъ отношеніи должны находиться количества различнаго пороха. Положимъ, что смѣшанный порохъ будетъ продаваться по означенной цѣнѣ, т. е., по 73 коп., то на каждый фунтъ пороха перваго сорта, входящій въ составъ смѣшенія, получится убытокъ 12 коп.; на каждый же фунтъ втораго сорта, содержащійся въ смѣшеніи, будетъ прибыли 4 коп. Изъ сего явствуетъ, что перваго должно быть менѣе въ смѣшеніи, нежели втораго, потому что убытокъ съ перваго болѣе прибыли со втораго. Поелику на каждый фунтъ перваго сорта 12 коп. убытку, а на каждый фунтъ втораго 4 коп. прибыли, то перваго должно

быть меньше нежели вшорато, и во столько разъ меньше, во сколько 4 меньше 12, т. е., если вшорато сорта возьмемъ 12 фунтовъ, то первого должно взять только 4 фунта.

Изъ сего слѣдуетъ, что въ каждахъ 16 фунтахъ смѣшаннаго пороха должно заключаться 4 фунта первого и 12 фунтовъ вшорато. А какъ во всемъ смѣшеніи должно быть 16 фунтовъ, то, чтобы найти сколько пороха обоихъ сортовъ должно заключаться во всемъ смѣшеніи, надлежитъ составить слѣдующія пропорціи:

$$x^{\Phi} : \frac{1}{4}^{\Phi} = 16^{\Phi} : \frac{4}{16}^{\Phi}; x = \frac{16}{4}^{\Phi} = 4^{\Phi}.$$

$$x'^{\Phi} : \frac{3}{12}^{\Phi} = \frac{5}{16}^{\Phi} : \frac{4}{16}^{\Phi}; x' = \frac{16}{12}^{\Phi} = 1\frac{1}{3}^{\Phi}.$$

гдѣ  $x$ , равный  $4^{\Phi}$ , означаетъ число фун. первого пороха, а  $x'$ , равный  $1\frac{1}{3}^{\Phi}$ , означаетъ число фунтовъ вшорато пороха.

Повѣрка.  $4^{\Phi}$ . 1<sup>го</sup> сорта по 85 коп., 2 руб. 12½ к.

$1\frac{1}{3}^{\Phi}$ . 2<sup>го</sup> сорта по 69 коп., 5 руб. 17½ к.

10 ф. смѣшаннаго пороха, 7 руб. 30 к.

слѣд. 10 фунтовъ смѣшаннаго пороха должны стоить 7 руб. 30 коп.; а посему цѣна одного фунта 73 коп.

Изъ сей задачи слѣдуетъ, что должно сдѣлать слѣдующее дополненіе къ опредѣленію правила смѣшенія: *правиломъ смѣшенія так-*



же называется способъ опредѣлять количества смѣшиваемыхъ вещей, зная цѣну известной мѣры смѣшенія и смѣшиваемыхъ вещей.

Для опредѣленія же количества, въ которомъ смѣшиваемыя вещи должны быть взяты, чтобы составить смѣшеніе требуемой цѣны и мѣры, зная цѣну смѣшиваемыхъ вещей, надлежитъ:

I. Сравнить цѣны смѣшиваемыхъ двухъ вещей съ требуемою среднею цѣною и опредѣлить разности оныхъ.

II. Для опредѣленія первой смѣшиваемой вещи должно составить слѣдующую пропорцію: количество первой смѣшиваемой вещи относится ко второй разности, какъ все количество смѣшенія къ суммѣ разностей.

III. Для опредѣленія второй смѣшиваемой вещи надлежитъ составить слѣдующую пропорцію: количество второй смѣшиваемой вещи относится къ первой разности, какъ все количество смѣшенія къ суммѣ разностей.

### § 140. Заключение.

Въ введеніи было сказано, что числа всѣхъ родовъ составляютъ предметъ Арифметики. Разсмотримъ теперь поочередно, чѣмъ зани-

маются сія наука, и въ какой связи находятся всѣ ея части.

Мы видѣли, что числа суть двоякаго рода: простые и именованныя, и что оныя раздѣляются еще на цѣлыя и дробныя. Тѣ и другія, какъ величины, могутъ увеличиваться и уменьшаться. Число увеличивается чрезъ прибавленіе къ оному другихъ чиселъ, и такимъ образомъ происходитъ дѣйствіе, называемое *сложеніемъ*. Число можетъ еще увеличиваться и чрезъ повтореніе самаго числа, и дѣйствіе, по которому находится такая сумма, именуется *умноженіемъ*. Уменьшеніе можетъ быть также произведено двоякимъ образомъ: отниманіемъ *неравныхъ* и *равныхъ* чиселъ, и для опредѣленія искомыхъ чиселъ имѣются два рода вычисленій: *вычитаніе* и *дѣленіе*. Упомянутыя четыре дѣйствія могутъ быть произведены не только съ простыми цѣлыми числами, но также и съ дробными. Слѣдствіе о *именованныхъ числахъ* есть примѣненіе правилъ, выведенныхъ для простыхъ чиселъ, и изъ оной явствуетъ практическая польза предъидущихъ слѣдствій.

О какомъ нибудь предметѣ только чрезъ *сравненіе* съ другими можно составить точное и ясное понятіе, посему сравненіе чиселъ между собою необходимо. Изъ сего сравненія выводятся *отношенія* чиселъ, которыя бы-

ваютъ *разностныя* и *кратныя*. Разсматривая однородныя отношенія чиселъ, не трудно замѣнить, что оныя могутъ быть равны, и изъ таковыхъ соснавляются *пропорціи*, которыя также бывають *разностныя* и *кратныя*. На послѣднюю должно обратить особенное вниманіе, ибо на оной основаны правила, называемыя *тройными*, посредствомъ которыхъ рѣшается большая часть практическихъ задачъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что *Арифметика* имѣетъ своимъ предметомъ различные роды вычисленія, которые должны быть производимы для опредѣленія неизвѣстныхъ чиселъ посредствомъ извѣстныхъ, по даннымъ отношеніямъ между оными.





## ПРИБАВЛЕНІЕ I<sup>ое</sup>.

О ВОЗВЫШЕНІИ ВО ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ СТЕПЕНИ, И ИЗВЛЕЧЕНІИ КОРНЕЙ ТѢХЪ ЖЕ СТЕПЕНЕЙ (\*).

§ 141. О возвышеніи въ степени и извлеченіи корней вообще.

Если какое нибудь число будетъ взято множителемъ два или нѣсколько разъ, то произведеніе, отъ такого умноженія происходящее, называется *степенью* данного числа. Если данное число взято множителемъ два раза, то получаемое произведеніе именуется *второю степенью* или *квадратомъ* онаго, на прим. 25 есть вторая степень или квадратъ 5, ибо  $5 \times 5 = 25$ . Если данное число возьмемъ множителемъ три раза, то происходящее отъ того произведеніе называется *третью степенью* или *кубомъ* данного числа; на прим. 27 есть кубъ 3, ибо  $3 \times 3 \times 3 = 27$ . Число показывающее сколько разъ данное число должно быть взято множителемъ, именуется *показа-*

---

(\*) Сія статья помѣщена для тѣхъ, которые въ Уѣздныхъ Училищахъ обучаются Геометріи.

*телемъ степени*, и спавишся надъ даннымъ числомъ: на примѣръ  $(6)^2$  значить, что число 6 должно быть взято множителемъ 2 раза; слѣд.  $(6)^2 = 6 \times 6 = 36$ ;  $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ . Обратно, если пребудется приискать число, которое должно быть взято множителемъ два или болѣе разъ, для составленія даннаго числа, то искомое называется *корнемъ*. На примѣръ, чтобы получить число 81, должно 9 взять множителемъ два раза; въ семь случаевъ 9 называется *корнемъ* даннаго числа. И поелику число 9 должно быть взято дважды множителемъ, то и называется *корнемъ второй степени* или *квадратнымъ корнемъ*.

Если для составленія даннаго числа пребудется приискать число, которое должно быть взято три раза множителемъ, то оно именуется *корнемъ третьей степени* или *кубическимъ корнемъ*. Напримѣръ 2 есть кубическій корень 8<sup>ми</sup>; ибо  $2 \times 2 \times 2 = 8$ . Для означенія корня употребляется знакъ  $\sqrt{\quad}$ , надъ которымъ спавишся число, показывающее какой степени корень долженъ быть най-

денъ. И такъ  $\sqrt[2]{49}$  означаетъ квадратный корень 49<sup>ми</sup>, а  $\sqrt[3]{64}$  кубическій корень 64<sup>хъ</sup>. При семъ надлежитъ еще замѣнить, что показанель квадратнаго корня не пишется, но подразумевается.

## § 142. О возвышеніи во вторую степень.

Возвышеніе одночленныхъ чиселъ во вторую степень не затруднительно; ибо искомыя произведенія находясь въ таблицѣ умноженія. Первые 9 чиселъ и ихъ вторыя степени или квадраты суть:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.

Для возвышенія двучленного числа, надлежитъ только умножить оное само на себя. Такъ на прим., квадратъ  $25^{\text{ми}} = 25 \times 25 = 625$ . Чтобы узнать, изъ какихъ частей составленъ найденный квадратъ, произведемъ умноженіе по частямъ. Данное число 25 состоитъ изъ двухъ членовъ, т. е., 2 десятковъ и 5 единицъ; слѣд. умножить 25 на 25 значить: умножить  $(20+5)$  на  $(20+5)$ . Чтобы сдѣлать сіе умноженіе, должно сперва  $20+5$  умножить на 20, и потомъ на 5. И такъ квадратъ данного числа состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

$$20 \times 20 = 400$$

квадрата 1<sup>го</sup> члена

$$5 \times 20 = 100$$

произ. изъ 1<sup>го</sup> чл. на 2<sup>й</sup>

$$20 \times 5 = 100$$

произ. изъ 2<sup>го</sup> чл. на 1<sup>й</sup>

$$5 \times 5 = 25$$

квадрата 2<sup>го</sup> члена.

Но какъ произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup> равно (§ 28) произведенію изъ 2<sup>го</sup> члена на 1<sup>й</sup>, то вмѣсто означенныхъ двухъ произведе-



нѣй можно взять удвоенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>. И такъ квадратъ двучленнаго числа состоитъ изъ трехъ частей: I, квадрата перваго члена; II. удвоеннаго произведенія изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, и III. квадрата втораго члена.

Чтобы вывести общее выраженіе для возвышенія какого нибудь прехчленнаго числа, на прим. 123, въ квадратъ, надлежитъ сумму первыхъ двухъ членовъ принять за одинъ членъ, и произвести умноженіе, какъ показано въ 1<sup>мъ</sup> примѣрѣ.

$$\begin{aligned}
 & \text{И такъ } (123)^2 = (120+3)^2 = \\
 & 120 \times 120 = 14400 \text{ квадрату суммы первыхъ} \\
 & \quad \text{двухъ членовъ;} \\
 & 3 \times 120 = 360 \text{ произв. изъ прешьяго чле-} \\
 & \quad \text{на на сумму первыхъ двухъ;} \\
 & 120 \times 3 = 360 \text{ произв. изъ суммы первыхъ} \\
 & \quad \text{двухъ членовъ на } 3^{\text{й}}, \\
 & 3 \times 3 = 9 \text{ квадр. } 3^{\text{го}} \text{ члена.}
 \end{aligned}$$

Но какъ произведеніе изъ 3<sup>го</sup> члена на сумму первыхъ двухъ равно произведенію изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на 3<sup>й</sup>; то изъ сего слѣдуетъ, что квадратъ прехчленнаго числа состоитъ изъ: I. квадрата суммы первыхъ двухъ членовъ, II. удвоеннаго произведенія изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на 3<sup>й</sup>, и III. квадрата 3<sup>го</sup> члена.

Но квадратъ суммы первыхъ двухъ членовъ равенъ квадрату первого члена, сложенному съ удвоеннымъ произведеніемъ изъ первого члена на второй и квадратомъ второго члена; поспавивъ равныя величины въѣсно равныхъ, выведемъ, что квадратъ пречленного числа состоишь изъ:

- I. квадрата первого члена,
- II. удвоеннаго произведенія изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>,
- III. квадрата второго члена,
- IV. удвоеннаго произведенія изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на третій.
- V. квадрата третьяго члена.

Если данное число будетъ четырехчленное, то для соснавленія квадрата слѣдуетъ только къ найденному выраженію для соснавленія квадрата прехчленныхъ чиселъ прибавишь удвоенное произведеніе изъ суммы первыхъ прехъ членовъ на 4<sup>й</sup> и квадратъ 4<sup>го</sup>, и ш. д.

Присовокупимъ здѣсь общее замѣчаніе о числѣ знаковъ, долженствующихъ быть въ квадратѣ. Поелику квадратъ меньшаго одночленного числа (ш. е. 1) есть 1, а меньшаго двухчленного числа (ш. е. 10) есть 100; то изъ сего явствуетъ, что квадраты всѣхъ одночленныхъ чиселъ заключающіяся между 1 и 100, ш. е., изображающіяся одною или двумя ци-

фрами. Квадрапъ меньшаго двучленнаго числа (10) есть 100, а меньшаго прехчленнаго числа (100) есть 10000; слѣд. квадрапы двучленныхъ чиселъ заключаются между 100 и 10000, т. е., изображаются тремя или четырьмя цифрами, и проч. Для удобнѣйшаго обозрѣнія прилагается слѣдующая таблица:

Если въ корнѣ 1 цифра, то въ квадрапѣ 1 или 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | 4  |
| — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 5 | — | 6  |
| — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 7 | — | 8  |
| — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 9 | — | 10 |

и т. д.

Изъ сей же таблицы явствуетъ, что въ квадрапѣ должно быть вдвое болѣе знаковъ нежели въ корнѣ, или вдвое болѣе безъ единицы.

Чтобы возвысить простую дробь, на прим.  $\frac{7}{9}$  во вторую степень, должно оную также взять множителемъ два раза. И такъ  $(\frac{7}{9})^2 = \frac{7}{9} \times \frac{7}{9} = \frac{7 \times 7}{9 \times 9} = \frac{49}{81}$ , т. е. чтобы возвысить простую дробь во вторую степень, слѣдуетъ только числителя и знаменателя возвысить во вторую степень.

Чтобы возвысить десятичную дробь во вторую степень, также надлежитъ только взять оную множителемъ 2 раза. И такъ  $(0,12)^2 = 0,12 \times 0,12 = 0,0144$ .



### § 143. О извлеченіи квадратныхъ корней.

Если данное число изображается одною или двумя цифрами, то квадратный корень оного можно иногда найти изъ таблицы умноженія; на прим. квадратный корень 16<sup>ти</sup> долженъ быть 4, ибо  $4 \times 4 = 16$ . Но не всякое двучленное число имѣетъ точный квадратный корень; на прим. 30<sup>ти</sup> квадратный корень долженъ быть болѣе 5, а менѣе 6, ибо  $5 \times 5 = 25$ , а  $6 \times 6 = 36$ ; данное же число заключается между 25 и 36, слѣд. искомый квадратный корень заключается между 5 и 6. Таковыя числа называются *неизвлекаемыми*, а корни оныхъ *несоизмѣримыми*. Способъ опредѣлять таковыя квадратныя корни почтиже будетъ ниже изложенъ.

Пусть будетъ 1681 данное многочленное число, коего квадратный корень требуется опредѣлить:

$$\begin{array}{r|l}
 \sqrt{1681} & 41 \\
 16 & \text{квадр. 1<sup>го</sup> члена} \\
 \hline
 8 & \begin{array}{l} 81 \\ 8 \text{ удвоен. произв. изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>ой</sup> \\ \text{1 квадратъ второго члена.} \end{array}
 \end{array}$$

Изъ таблицы, помѣщенной въ предыдущемъ параграфѣ, легко усмотрѣть, что въ искомомъ корнѣ должны быть двѣ цифры (ибо

если бы въ немъ была одна цифра, то въ данномъ числѣ не могло бы быть болѣе 2<sup>х</sup> цифръ; если же примемъ, что въ корнѣ 3 цифры, то данное число должно бы изображаться 6<sup>ю</sup> или покрайней мѣрѣ 5<sup>ю</sup> цифрами). И такъ искомый квадратный корень состоиптъ изъ десятковъ и единицъ. Въ предъидущемъ § было доказано, что квадратъ двучленнаго числа состоиптъ изъ квадрата перваго члена, удвоеннаго произведенія изъ перваго члена на вторъй и квадрата втораго члена; слѣд. въ данномъ числѣ 1681 должны заключаться всѣ упомянутыя части. Квадратъ перваго члена корня, т. е. десятковъ, заключается въ сотняхъ, ибо при умноженіи десятковъ на десятки всегда получающіяся сотни; и такъ квадратъ перваго члена искомаго корня долженъ заключаться въ цифрахъ, означающихъ сотни, т. е. въ 16. Квадратный корень сего числа есть 4, ибо  $4 \times 4 = 16$ , т. е. въ искомомъ корнѣ можетъ быть только 4 десятка. Взявъ квадратъ найденнаго члена корня, получимъ 16 сотенъ; и вычтя оный изъ даннаго числа, будемъ имѣть въ остаткѣ 81, въ которомъ должно еще заключаться удвоенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup> и квадратъ втораго. Произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена корня (т. е. десятковъ) на 2<sup>ый</sup> членъ корня (т. е. на единицы) должно непременно за-

ключаться въ однихъ только десяткахъ; слѣд. въ первомъ знакѣ найденнаго остатка. Зная, что удвоенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, или что произведеніе изъ удвоеннаго 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, заключается въ 8 десяткахъ, надлежитъ только 8 (десятковъ) раздѣлить на удвоенный первый членъ, т. е. на 8 (десятковъ), чтобы найти второй членъ. Раздѣливъ 8 (десятковъ) на 8 (десятковъ), получимъ 1 для второго члена корня. Умноживъ удвоенный первый членъ (8 десятковъ) на второй членъ (1 единицу), найдемъ, что удвоенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup> равно 8 десятковъ. Чтобы вычесть, подпишемъ подъ десятками найденнаго остатка. Осталось еще взять квадраты второго члена, который будетъ равенъ 1 (единицѣ). Вычтя всѣ найденныя числа, получимъ 0 въ остаткѣ. Изъ сего можно заключить, что данное число есть точный квадратъ 41 единицы, ибо изъ онаго по частямъ вычтенъ полный квадратъ 41 единицы; изъ сего же слѣдуетъ, что 41 есть точный квадратный корень даннаго числа.

Примѣръ 2. Извлечь квадратный корень изъ 119025.



$$\sqrt{11.90.25(345}$$

9      квадр. 1<sup>го</sup> члена

6 | 290  
 24 удвоен. произв. изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>  
 16 квадр. 2<sup>го</sup> члена.

---

256

68 | 3425  
 340 удвоен. произвед. изъ суммы  
 первыхъ двухъ членовъ на 3<sup>й</sup>  
 25 квадр. 3<sup>го</sup> члена.

---

3425

---

Изъ сказаннаго въ § 141 явствуетъ, что искомый корень долженъ состоятъ изъ 3 цифръ, т. е. изъ сотенъ, десятковъ и единицъ. Изъ тогоже § также слѣдуетъ, что въ данномъ числѣ должны заключаться слѣдующія части: квадратъ 1<sup>го</sup> члена искомага корня, удвоенное произведение изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, квадратъ 2<sup>го</sup>, удвоенное произведение изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на 3<sup>й</sup>, и квадратъ 3<sup>го</sup>. Квадратъ 1<sup>го</sup> члена искомага корня, который, какъ выше сказано, долженъ состоятъ изъ сотенъ, заключается въ десяткахъ тысячъ (ибо  $100 \times 100 = 1000$ ); слѣд. оный содержится въ первыхъ двухъ цифрахъ даннаго числа. Наибольшее квадратное число, въ 11 содержащееся, есть 9; слѣд. первый знакъ

корня есть 3 (сопни). Вычтя изъ 11 (десяп-  
 ковъ тысячъ) квадрапъ 3 сопень, п. е. 9  
 десяпковъ тысячъ, получимъ въ оспаш-  
 кѣ 2 десяпка тысячъ. Впорый знакъ кор-  
 ня означаетъ десяпки; слѣд. удвоенное про-  
 изведеіе изъ перваго члена (сопень) на  
 вторый (десяпки) заключаеся въ тыся-  
 чяхъ, п. е. въ 29 (тысячахъ). Раздѣливъ  
 сіе число на удвоенный первый членъ, п. е.  
 на 6 (сопень), получимъ въ частномъ 4, ко-  
 торое и будетъ вторымъ членомъ искомаго  
 корня. Умноживъ удвоенный первый членъ 6  
 (сопень) на найденный вторый членъ 4 (де-  
 сяпка), найдемъ, что удвоенное произведеіе  
 изъ перваго члена на вторый равно 24 (ты-  
 сячамъ). Подпишемъ сіе число подъ тысячами.  
 Теперь слѣдуетъ еще взять квадрапъ втора-  
 го члена, который равенъ 16 сопнямъ. Под-  
 писавъ сіе число надлежащимъ образомъ, сло-  
 жимъ съ прежде найденнымъ, и получимъ 256  
 сопень. Вычтя сію сумму, будемъ имѣть въ  
 оспашкѣ 34 сопни. Въ семь оспашкѣ и о-  
 стальныхъ двухъ знакахъ даннаго числа (25),  
 п. е. въ 3425 должно заключаться, какъ изъ  
 вышесказаннаго слѣдуетъ, удвоенное произве-  
 деіе изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на 3<sup>ий</sup>  
 и квадрапъ 3<sup>го</sup>. 3<sup>ий</sup> членъ искомаго корня о-  
 значаетъ единицы, а удвоенная сумма первыхъ  
 двухъ членовъ состоиптъ изъ десяпковъ, слѣд.

удвоенное произведение изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на третій, заключается въ десятикахъ, т. е. въ 342. Раздѣливъ сіе число на удвоенную сумму первыхъ двухъ членовъ (на 68), получимъ въ частномъ 5 (единицъ), которое и должно быть третьимъ членомъ искомаго корня. Умноживъ 68 (десятиковъ) на 5 (единицъ), найдемъ, что удвоенное произведение изъ суммы первыхъ двухъ членовъ на третій равно 340 десятикамъ; умноживъ 5 на 5, получимъ 25 (единицъ), квадраты третьяго члена. Подписавъ надлежащимъ образомъ и сложивъ, получимъ 3425. Вычтя сію сумму изъ остаточной части даннаго числа, будемъ имѣть 0 въ остаткѣ. Изъ сего можно заключить, что данное число есть точный квадратъ найденнаго числа 345, потому что изъ оного вычтены послѣдовательно всѣ части полного квадрата 345<sup>2</sup> безъ остатка; изъ сего же слѣдуетъ, что 345 есть точный квадратный корень даннаго числа.

Изъ послѣднихъ двухъ рѣшеній можно извлечь слѣдующія необходимыя замѣчанія для извлеченія квадратныхъ корней.

I. Нашедши первый членъ искомаго квадратнаго корня, нужно было къ остатку прибавить еще двѣ слѣдующія цифры даннаго



числа для опредѣленія второго члена. Также для опредѣленія шрепяго члена искомага корня надлежало прибавить оспальныя двѣ цифры даннаго числа. На семъ основано раздѣленіе даннаго числа, ошъ правой стороны къ лѣвой, на грани, состоящія изъ двухъ цифръ. Въ послѣдней можешъ бытъ шакже и 1 знакъ. Сіе раздѣленіе даннаго числа на грани служить къ опредѣленію числа знаковъ искомага корня.

II. Чшобъ опредѣлить второй членъ искомага корня, надлежало удвоенное произведепіе изъ перваго члена на второй раздѣлить на удвоенный первый членъ. Здѣсь нужно замѣнить, что сіе удвоенное произведепіе заключалось въ оспашкѣ ошъ первой грани и въ *первой* цифрѣ второй. Сіе замѣчаніе ошносится и ко всѣмъ послѣдующимъ удвоеннымъ произведеніямъ.

Примѣръ 3. Извлечь квадрашный корень изъ 43264.

$$\begin{array}{r} \sqrt{43264} \quad (208 \\ 4 \\ 40 \overline{) 3264} \\ \underline{320} \phantom{0} \\ 64 \\ \underline{64} \\ 0 \end{array}$$

При рѣшеніи сей задачи должно замѣнить, что если удвоенное произведепіе изъ перваго

члена на второй, т. е. (3) раздѣлимъ на удвоенный первый членъ (4), то получимъ въ частномъ 0, т. е., въ искомомъ корнѣ десятковъ не заключается, и поему надлежитъ поставивъ въ корнѣ 0 на мѣстѣ десятковъ, и потомъ поступать, какъ въ предъидущемъ примѣрѣ показано.

*Примѣчаніе.* При извлеченіи квадратныхъ корней можно сдѣлать слѣдующее сокращеніе: вмѣсто того, чтобы брать квадратъ второго члена отдѣльно, и потомъ оный прикладывавъ къ удвоенному произведенію изъ перваго члена на 2<sup>й</sup>, можно сію сумму получить вдругъ, поставивъ найденный второй членъ подлѣ удвоеннаго перваго и умноживъ потомъ на второй членъ, ибо въ семъ произведеніи непременно должно заключаться и удвоенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup> и квадратъ 2<sup>го</sup>. Подобнымъ же образомъ надлежитъ поступать при опредѣленіи третьяго и всѣхъ слѣдующихъ членовъ. Чтобы въ семъ легче увѣриться чрезъ сравненіе, рѣшимъ такимъ образомъ вышеприведенный 2<sup>ой</sup> примѣръ:

Извлекъ квадратный корень изъ 119025.

$$\sqrt{11.90.25} (345$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 64 \overline{) 290} \\ \underline{256} \\ 685 \overline{) 2425} \\ \underline{3425} \end{array}$$

Примѣръ 4. Извлечь квадратный корень изъ 5317636.

$$\sqrt{5.31.76.36} (2306$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 43 \overline{) 131} \\ \underline{129} \\ 4606 \overline{) 27636} \\ \underline{27636} \end{array}$$

Изъ предъидущихъ рѣшеній можно вывести слѣдующія правила для извлечения квадратныхъ корней изъ данныхъ цѣлыхъ чиселъ:

I. Поставивъ знакъ квадратнаго корня надъ даннымъ числомъ, надлежитъ раздѣлить оное, съ правой стороны къ лѣвой, на грани, полагая въ каждой по 2 цифры, кромѣ послѣдней, въ которой можетъ быть и 1 цифра.

II. Нашедши наибольшее квадратное число, содержащееся въ первой грани, должно соотвѣтствующій оному квадратный корень, поставить первымъ членомъ искомаго корня.



III. Вычестъ квадратъ найденнаго перваго члена искомаго квадратнаго корня изъ первой грани.

IV. Прибавивъ къ остатку слѣдующую грань, отчеркнуть отъ оной первую цифру (для удвоеннаго произведенія).

V. Передъ симъ числомъ поставить удвоенный первый членъ корня, и раздѣлить первое число на второе; найденное частное будетъ вторымъ членомъ корня. Если же первое число менѣе втораго, то ставится 0 въ корнѣ.

VI. Поставивъ найденный второй членъ подлѣ удвоеннаго перваго, умножить полученную сумму на второй членъ.

VII. Полученное произведение вычестъ изъ числа, состоящаго изъ остатка отъ первой грани и второй грани.

VIII. Чтобъ найти третій и прочіе члены корня должно поступать точно такъ же, какъ и при опредѣленіи втораго члена, принимая сумму предъидущихъ членовъ корня за одинъ членъ.

§ 144. Извлеченіе квадратныхъ корней изъ простыхъ дробей.

Чтобъ возвысить простую дробь въ квадратъ, надлежитъ (§ 141) возвысить ея числителя и знаменателя во вторую степень.

Изъ сего слѣдуетъ, что для извлеченія квадратнаго корня изъ простой дроби, должно сдѣлать обратное дѣйствіе, т. е. извлечь квадратный корень какъ изъ числителя, такъ и изъ знаменателя, и корень первого будетъ числителемъ, а второго знаменателемъ.

Примѣры:

$$\text{I. } \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{II. } \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{5}{6}.$$

$$\text{III. } \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10}$$

Если же числитель, или знаменатель, или оба члена дроби суть неизвлекаемые числа, то простая дробь обращается въ десятичную, и изъ послѣдней извлекается квадратный корень, какъ будетъ показано въ слѣдующемъ параграфѣ.

§ 145. *Извлеченіе квадратныхъ корней изъ десятичныхъ дробей.*

Пусть будетъ 0,6084, десятичная дробь, изъ которой пребудетъ извлечь квадратный корень.

$$\sqrt{0,60.84(0,78}$$

$$\begin{array}{r} 49 \\ 148 \overline{) 1184} \\ \underline{1184} \end{array}$$

Поелику въ данномъ числѣ единицъ нѣтъ, то и въ корнѣ не можетъ быть цѣлаго чи-

сла; и такъ должно поставитъ въ корнѣ оцѣлыхъ. Слѣдующій знакъ въ корнѣ означаетъ десятыя доли единицы; а квадратъ десятихъ заключается въ сотыхъ (ибо  $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$ ), слѣд. квадратъ перваго десятичнаго знака искомага корня долженъ заключаться въ двухъ первыхъ десятичныхъ знакахъ дроби, ш. е., въ 60. Наибольшее квадратное число, въ оныхъ заключающееся, есть 49; квадратный же корень 49 есть 7; слѣд. 7 долженъ быть первымъ десятичнымъ знакомъ искомага корня. Взявъ квадратъ найденнаго члена и вычтя изъ соотвѣствующихъ знаковъ данной дроби, получимъ въ остаткѣ 11. Второй десятичный знакъ искомага корня означаетъ сотыя доли единицы; квадратъ сотыхъ долей даетъ десяти тысячныя доли (ибо  $\frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{10000}$ ); слѣд. нужно снести остальные двѣ цифры данной десятичной дроби, чтобы опредѣлить 2<sup>ой</sup> десятичный знакъ искомага корня. Въ 1184 должно содержаться удвоенное произведеніе изъ перваго члена корня на второй, и квадратъ втораго. Поелику первый членъ состоитъ изъ десятихъ, а 2<sup>й</sup> изъ сотыхъ, то изъ сего слѣдуетъ, что удвоенное произведеніе должно содержаться въ тысячныхъ доляхъ, ш. е. въ остаткѣ отъ первой грани, и первой цифрѣ второй. Удвоенный первый членъ 14 въ 118 содержится 8 разъ, и такъ 8 есть



второй десятичный знак искомого корня. Прибавивъ 8 къ 14 и умноживъ 148 на 8, получимъ въ произведеніи (означающемъ удвоенное произведеніе изъ перваго члена на второй и квадратъ втораго) 1184. Вычтя сіе число отъ оставшейся части данной десятичной дроби, получимъ 0 въ остаткѣ, что и означаетъ, что 0,78 есть точный квадратный корень данной дроби.

Изъ послѣдняго рѣшенія явствуетъ, что правила для извлеченія квадратныхъ корней изъ десятичныхъ дробей суть шѣже самыя, какія были выведены для извлеченія квадратныхъ корней изъ цѣлыхъ чиселъ, съ шѣмъ только различіемъ, что при извлеченіи квадратныхъ корней изъ десятичной дроби, сія послѣдняя раздѣляется на грани отъ лѣвой стороны къ правой, начиная отъ занятой, и полагая также по 2 цифры въ каждой грани. Можетъ случиться, что для послѣдней грани останется одна цифра, если число оныхъ въ данной десятичной дроби будетъ нечетное: въ такомъ случаѣ прибавляется 0 къ данной дроби, чтобы пополнить послѣднюю грань; дробь же, какъ извѣстно изъ предъидущаго (§ 97), не перемѣнитъ своей величины.

Примѣръ. Извлечь квадратный корень изъ 0,6.

$$\begin{array}{r} \sqrt{0,60} (0,7 \\ \underline{49} \\ 11 \end{array}$$

Здѣсь надлежитъ замѣтить, что данная десятичная дробь должна быть сперва приведена въ сотыя доли, потому что квадратъ десятичныхъ, изъ которыхъ искомый квадратный корень долженъ состоять, заключается не въ десятичныхъ, а въ сотыхъ (ибо  $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$ ); попомъ же надлежитъ поступать по вышеизложеннымъ правиламъ.

Если данное число состоитъ изъ цѣлаго числа съ десятичною дробью, то цѣлое число раздѣляется на грани отъ правой стороны къ лѣвой, начиная отъ запятой, а десятичная дробь отъ лѣвой къ правой.

Примѣръ. Извлечь квадратный корень изъ 534,5344.

$$\begin{array}{r} \sqrt{534,5344} (23,12 \\ 4 \\ \hline 43 \overline{)134} \\ \underline{129} \\ 461 \overline{)553} \\ \underline{461} \\ 4622 \overline{)9244} \\ \underline{9244} \end{array}$$

§ 146. Извлеченіе приближенныхъ квадратныхъ корней изъ извлекаемыхъ чиселъ.

Въ § 143 было упомянуто, что изъ вѣкопорохъ чиселъ точнаго квадратнаго корня извлечь не можно: на прим. квадратный корень 5 долженъ заключаться между  $2^{\text{ми}}$  и  $3^{\text{ми}}$ , ибо число 5 заключается между квадратами  $2^{\text{хъ}}$  и  $3^{\text{хъ}}$ , то есть между 4 и 9. Если же истребуется найти квадратный корень точнѣе, то должно искать, сколько въ ономъ содержится десятиныхъ долей единицы. Поелику квадратъ десятиныхъ содержится въ сотыхъ, то надлежитъ ошибкою (1 единицу) привести въ сотыя, и поступая для опредѣленія 2<sup>го</sup> члена корня какъ показано въ предыдущемъ параграфѣ.

$$\begin{array}{r} \sqrt{5} (2, 2 \\ 4 \\ 42 \overline{) 100} \\ \underline{84} \\ 16 \end{array}$$

Изъ сего рѣшенія видно, что въ искомомъ квадратномъ корнѣ, сверхъ двухъ единицъ, должно быть еще двѣ десятиныхъ. Чтобы опредѣлить, сколько сотыхъ въ корнѣ, надлежитъ къ ошибку прибавить еще 2 нуля, и. е., привести въ десятинысячныя доли



(ибо  $\frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{10000}$ ), и потомъ поступать по предыдущему.

$$\begin{array}{r} \sqrt{5} (2, 23... \\ 4 \\ \hline 42 \overline{)100} \\ \underline{84} \\ 443 \overline{)1600} \\ \underline{1329} \\ 271 \end{array}$$

Продолжая такимъ образомъ прибавляя къ остатку по 2 нуля, можно получить въ квадратномъ корнѣ произвольное число знаковъ; и квадратный корень будетъ тѣмъ точнѣе, чѣмъ болѣе въ немъ десятичныхъ знаковъ.

### § 147. О возвышеніи въ третью степень.

Чтобы найти третью степень, или кубъ какогонибудь числа, надлежитъ оное взять множителемъ три раза, и произведение изъ оныхъ будетъ искомое число. И такъ кубъ  $2^{\text{хв}} = 2 \times 2 \times 2 = 8$ .

Такимъ образомъ составлена слѣдующая таблица, въ которой въ первой строкѣ помѣщены одночленные числа, а подъ ними ихъ кубы.

|    |    |     |     |      |      |      |      |      |
|----|----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1. | 8. | 27. | 64. | 125. | 216. | 343. | 512. | 729. |

Чтобы возвысить данное двучленное число въ третью степень, должно также найти

произведеиіе, которое состояло бы изъ трехъ множишелей, изъ коихъ каждый былъ бы равенъ данному числу. На прим. кубъ  $43^{\text{хъ}} = 43 \times 43 \times 43 = 79507$ . Въ послѣдствіи (для извлеченія кубическихъ корней) надобно будешь знать, изъ какихъ частей состояишь кубъ двучленныхъ чиселъ; для сего произведемъ умноженіе по частямъ. Если данное число 43 возвысимъ во вторую степень, то получимъ (по § 141) квадратъ перваго члена, удвоенное произведеніе изъ перваго члена на второй и квадратъ второго, т. е.,  $40 \times 40 + 2 \times 40 \times 3 + 3 \times 3$ .

Чтобы найти кубъ данного числа, надлежитъ полученную вторую степень умножить еще на данное число, т. е., на 43. Умноживъ сперва на 40, а потомъ на 3, получимъ:

$$\begin{array}{lcl}
 40 \times 40 & \left| \begin{array}{l} \text{умно-} \\ \text{живъ} \\ \text{на} \\ 40 \end{array} \right. & = 40 \times 40 \times 40, \text{ кубъ } 1^{\text{го}} \text{ члена.} \\
 2 \times 40 \times 3 & & = 2 \times 40 \times 3 \times 40, \text{ удвоенное произв. изъ квад. } 1^{\text{го}} \text{ члена на } 2^{\text{й}}. \\
 3 \times 3 & & = 3 \times 3 \times 40, \text{ произв. изъ квад. } 2^{\text{го}} \text{ члена на } 1^{\text{ый}}.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 40 \times 40 & \left| \begin{array}{l} \text{умно-} \\ \text{живъ} \\ \text{на } 3 \end{array} \right. & = 40 \times 40 \times 3, \text{ произв. изъ квадрата } 1^{\text{го}} \text{ члена на } 2^{\text{й}}. \\
 2 \times 40 \times 3 & & = 2 \times 40 \times 3 \times 3, \text{ удвоен. произв. изъ } 1^{\text{го}} \text{ чл. на квадратъ } 2^{\text{го}}. \\
 3 \times 3 & & = 3 \times 3 \times 3, \text{ кубъ } 2^{\text{го}} \text{ члена.}
 \end{array}$$

И такъ кубъ двучленного числа состоитъ изъ слѣдующихъ частей: 1) куба 1<sup>го</sup> члена; 2) удвоеннаго произведенія изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>; 3) произведенія изъ квадрата 2<sup>го</sup> члена на 1<sup>й</sup>; 4) произведенія изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>; 5) удвоеннаго произведенія изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup>; 6) куба втораго члена. Но удвоенное произведеніе изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, (см. 2) и произведеніе изъ квадрата 1<sup>го</sup> на 2<sup>й</sup> (см. 4), составляютъ вмѣстѣ упрощенное произведеніе изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>. Также произведеніе изъ квадрата 2<sup>го</sup> члена на 1<sup>й</sup> (см. 3), и удвоенное произведеніе изъ квадрата 2<sup>го</sup> члена на 1<sup>й</sup> (см. 5), равны упрощенному произведенію изъ квадрата 2 члена на 1<sup>й</sup>; слѣд.

Кубъ двучленного числа состоитъ: I. изъ куба 1<sup>го</sup> члена; II. упрощеннаго произведенія изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>; III. упрощеннаго произведенія изъ квадрата 2<sup>го</sup> члена на 1<sup>й</sup>, и IV. куба втораго члена.

Чтобы вывести общее выраженіе для возвышенія трехчленного числа, на прим. 643, въ кубъ, должно сумму первыхъ двухъ членовъ принять за одинъ, и произвести умноженіе, какъ показано въ первомъ примѣрѣ.

$$\text{И такъ } (643)^3 = (640 + 3)^3 =$$



- $(640)^3$  кубу суммы первых двух членовъ,  
 $3 \times (640)^2 \times 3$  упрощенному произв. изъ квадрата  
 суммы первых двух членовъ на  $3^2$ ,  
 $3 \times 640 \times (3)^2$  упрощенному произв. изъ суммы пер-  
 выхъ двух членовъ на квадратъ  $3^{\text{го}}$ ,  
 $(3)^3$  кубу 3 члена.

Но  $(640)^3$ , т. е., кубъ суммы первых двух членовъ равенъ кубу перваго члена, упрощенному произведению изъ квадрата  $1^{\text{го}}$  члена на  $2^3$ , упрощенному произведению изъ квадрата  $2^{\text{го}}$  члена на  $1^3$ , и кубу  $2^{\text{го}}$  члена; слѣд., поставивъ равныя числа вмѣсто равныхъ, найдемъ, что кубъ шрехчленнаго числа состоитъ изъ:

- I. куба  $1^{\text{го}}$  члена,
- II. упрощеннаго произведенія изъ квадрата  $1^{\text{го}}$  члена на  $2^3$ ,
- III. упрощеннаго произведенія изъ  $1^{\text{го}}$  члена на квадратъ  $2^{\text{го}}$ ,
- IV. куба  $2^{\text{го}}$  члена,
- V. упрощеннаго произведенія изъ квадрата суммы первых двух членовъ на  $3^3$ ,
- VI. упрощеннаго произведенія изъ суммы первых двух членовъ на квадратъ  $3^{\text{го}}$  члена,
- VII. куба  $3^{\text{го}}$  члена.

Если данное число будетъ четырехчленное, то для составленія куба, слѣдуетъ къ найденному выраженію для составленія куба шрехчленнаго числа прибавить: упрощенное произ-

веденіе изъ квадрата суммы первыхъ трехъ членовъ на  $4^2$ , упрощенное произведеніе изъ суммы первыхъ трехъ членовъ на квадратъ  $4^{\text{го}}$  и кубъ  $4^{\text{го}}$  члена, и ш. д.

Что же касается до числа цифръ, которыя должны быть въ кубѣ какаго нибудь числа, надлежитъ замѣнить слѣдующее: поелику кубъ меньшаго одночленного числа (ш. е. 1), есть 1, а меньшаго двучленного числа (ш. е. 10) есть 1000, то изъ сего явствуетъ, что кубы всѣхъ одночленныхъ чиселъ заключающіяся между 1 и 1000, ш. е., изображающіяся 1, 2 или 3 цифрами. Кубъ меньшаго двучленного числа (10) есть 1000, а меньшаго трехчленного числа (100) есть 1000000; слѣд. кубы двучленныхъ чиселъ изображающіяся 4, 5 или 6 цифрами.

Для удобнѣйшаго обзорѣнія прилагается слѣдующая таблица:

Если въ корнѣ 1 цифра, то въ кубѣ 1, 2 или 3 цифр.

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| — — — — 2 | — — — — — 4, 5 — 6 —    |
| — — — — 3 | — — — — — 7, 8 — 9 —    |
| — — — — 4 | — — — — — 10, 11 — 12 — |

и ш. д.

Чтобы возвысить простую дробь, на прим.  $\frac{2}{3}$ , въ третью степень, должно оную также взять множителемъ 3 раза. И такъ  $(\frac{2}{3})^3 =$

$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2 \times 2}{3 \times 3 \times 3} = \frac{8}{27}$ , т. е., чтобы возвысить простую дробь въ третью степень, слѣдуетъ только числителя и знаменателя возвысить въ третью степень; первое число сдѣлать числителемъ, а второе знаменателемъ.

Чтобы возвысить десятичную дробь въ третью степень, должно также оную взять множителемъ 3 раза. На прим.  $(0,25)^3 = 0,25 \times 0,25 \times 0,25 = 0,015625$ .

#### § 148. О извлеченіи кубическихъ корней.

Пусть будетъ 79507 данное многочленное число, коего кубическій корень требуется опредѣлить.

$$\begin{array}{r}
 \sqrt[3]{79507} \quad (43. \\
 \quad 64 \quad \text{кубъ 1}^{\text{го}} \text{ члена.} \\
 48 \left| \begin{array}{r}
 15507 \\
 144 \text{ умножен. произв. изъ квадрата 1}^{\text{го}} \\
 \quad \quad \quad \text{члена на 2}^{\text{й}}. \\
 108 \text{ умножен. произв. изъ 1}^{\text{го}} \text{ чл. на ква-} \\
 \quad \quad \quad \text{дратъ 2}^{\text{го}}. \\
 27 \text{ кубъ 2}^{\text{го}}. \\
 \hline
 15507
 \end{array}
 \right.
 \end{array}$$

Изъ таблицы, помѣщенной въ предъидущемъ параграфѣ явствуетъ, что въ корнѣ должно быть 2 знака; слѣд. онъ состоитъ изъ де-



десятковъ и единицъ. Въ предъидущемъ же параграфѣ было доказано, что кубъ двучленного числа состоитъ изъ куба 1<sup>го</sup> члена, упрощеннаго произведенія изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, упрощеннаго произведенія изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup>, и куба 2<sup>го</sup> члена; слѣд. въ данномъ числѣ 79507 должны заключаться всѣ упомянутыя части. Кубъ 1<sup>го</sup> члена корня, т. е., десятковъ заключается въ тысячахъ, (ибо  $(10)^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$ ), слѣд. въ первыхъ двухъ цифрахъ даннаго числа. Наибольшее кубическое число въ 79 содержащееся есть 64; слѣд. кубическій корень сего числа, 4 (десятика), есть первый членъ искомаго кубическаго корня. Взявъ кубъ найденнаго первого члена искомаго корня, получимъ 64, и отнявъ оный отъ соотвѣствующихъ знаковъ даннаго числа, получимъ въ остаткѣ 15 тысячъ. Въ семь остаткѣ и остальныхъ цифрахъ даннаго числа должно заключаться упрощенное произведеніе изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>, упрощенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup> и кубъ 2<sup>го</sup>. Опредѣлимъ сперва, въ какихъ цифрахъ содержится упрощенное произведеніе изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>й</sup>. Квадратъ первого члена (т. е. десятковъ) заключается въ сотняхъ; умноживъ сотни на второй членъ, т. е. единицы, получимъ сотни же; слѣд. оное произведеніе заключается въ сотняхъ,

и. е. въ 155. Чшобъ найши второй членъ, надлежитъ сіе произведение раздѣлить на упрощенный квадратъ перваго члена, и. е. на 48 сотень, (ибо  $4 \text{ дес.} \times 4 \text{ дес.} = 16 \text{ сотн.}; 16 \text{ сотн.} \times 3 = 48 \text{ сотн.}$ ). Раздѣливъ 155 на 48, получимъ въ частномъ 3, которое число и будетъ вторымъ членомъ искомаго корня. Умноживъ упрощенный квадратъ перваго члена, 48 (сотень) на второй членъ 3 (един.) будемъ имѣть 144 сотни, которыя и должно подписать подъ соотвѣствующими цифрами остатка. Далѣе, въ упомянутомъ остаткѣ должно содержаться еще упрощенное произведение изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup> члена. Квадратъ 2<sup>го</sup> члена  $= 3 \text{ ед.} \times 3 \text{ ед.} = 9 \text{ единицамъ};$  слѣд. произведение изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup>  $= 4 \text{ дес.} \times 9 \text{ един.} = 36 \text{ десятк.};$  а упрощенное произведение  $= 3 \times 36 \text{ дес.} = 108 \text{ десяткамъ.}$  Подписавъ сіе число подъ соотвѣствующими цифрами остатка, надлежитъ еще найши кубъ 2 члена. Кубъ 3 (един.)  $= 27 \text{ единицамъ.}$  И сіе число должно подписать подъ соотвѣствующими цифрами остатка. Сложивъ всѣ найденныя частныя, получимъ 15507, и вычтя сіе число, будемъ имѣть въ остаткѣ 0. Изъ сего можно заключить, что данное число есть точный кубъ  $43^{\text{хв}}$  единицъ, ибо изъ онаго по частнымъ вычтень безъ остатка полный кубъ  $43^{\text{хв}}$ ; изъ сего же слѣдуетъ, что

43 есть точный кубическій корень данного числа.

Примѣръ 2. Извлечь кубическій корень изъ 614125.

$$\begin{array}{r}
 \sqrt[3]{614.125} \begin{array}{l} 85 \\ 8 \end{array} \\
 \underline{512} \\
 192 \overline{) 102125} \\
 \underline{960} \\
 600 \\
 \underline{125} \\
 102125
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{l} 8 \\ 3 \end{array} \\
 64 = (8)^2 \\
 \underline{3} \\
 192 = 3 \times (8)^2 \\
 \underline{5} \\
 960 = 3 \times (8)^2 \times 5
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{l} 5 \\ 8 \end{array} \\
 25 = (5)^2 \\
 \underline{8} \\
 200 = (5)^2 \times 8 \\
 \underline{3} \\
 600 = 3 \times (5)^2 \times 8
 \end{array}
 \end{array}$$

Изъ сихъ рѣшеній можно вывести слѣдующія замѣчанія для извлеченія кубическихъ корней:

I. Нашедши первый членъ искомага кубическаго корня, нужно было къ остатку прибавить еще три слѣдующія цифры для опредѣленія 2<sup>го</sup> числа. Подобными разсужденіями можно вывести (если искомый кубическій корень будетъ состоять изъ трехъ и болѣе цифръ), что для опредѣленія 3<sup>го</sup>, 4<sup>го</sup> членовъ и п. д. нужно къ остаткамъ прибавлять по 3 цифры. На семъ основано раздѣленіе данныхъ чиселъ, отъ правой стороны къ лѣвой, на



границы, состоящая изъ 3 цифръ. Въ послѣдней границѣ можетъ быть также 1 и 2 знака.

II. Чтобы опредѣлить второй членъ искомага корня, надлежало упрощенное произведеніе изъ квадрата перваго члена на 2<sup>й</sup> раздѣлить на упрощенный квадратъ 1<sup>го</sup> члена. Нужно замѣтить, что сіе упрощенное произведеніе заключается въ остатокѣ отъ первой границы и первой цифръ второй. Далѣе, упрощенное произведеніе изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup> заключается въ единицахъ слѣдующаго меньшаго разряда; и наконецъ кубъ 2 члена также содержится въ единицахъ слѣдующаго меньшаго разряда. Отъ сего-то происходитъ, что для вычитанія первый знакъ перваго произведенія ставится подъ первымъ знакомъ второй границы, первый знакъ второго произведенія подписывается подъ второю цифрою, а первый знакъ куба 2<sup>го</sup> члена подъ 3<sup>ьей</sup> цифрою той же границы. Тоже самое можно замѣтить и при опредѣленіи всякаго послѣдующаго члена.

Основываясь на сихъ замѣчаніяхъ, рѣшимъ слѣдующіе примѣры:

Примѣръ 3. Извлечь кубическій корень изъ  
88716536.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sqrt[3]{88.716.536(446}$                                                                                          | $\begin{array}{r} 4 \\ 4 \\ 16=(4)^2 \\ 3 \\ 48=3 \times (4)^2 \\ 4 \\ 192=3 \times (4)^2 \times 4 \end{array}$                          | $\begin{array}{r} 4 \\ 4 \\ 16=(4)^2 \\ 4 \\ 64=(4)^2 \times 4 \\ 3 \\ 192=3 \times 4 \times (4)^2 \end{array}$                     |
| $\begin{array}{r} 64 \\ 48 \overline{) 24716} \\ \underline{192} \\ 192 \\ \underline{64} \\ 21184 \end{array}$     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| $\begin{array}{r} 5808 \overline{) 3532536} \\ \underline{34848} \\ 4752 \\ \underline{216} \\ 3532536 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 44 \\ 44 \\ 176 \\ 176 \\ 1936=(44)^2 \\ 3 \\ 5808=3 \times (44)^2 \\ 6 \\ 34848=3 \times (44)^2 \times 6 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6 \\ 6 \\ 36=(6)^2 \\ 44 \\ 144 \\ 144 \\ 1584=(6)^2 \times 44 \\ 3 \\ 4752=3 \times 44 \times (6)^2 \end{array}$ |

Примѣръ 4. Извлечь кубическій корень изъ  
191016.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sqrt[3]{1.191.016(106}$                                                                                            | $\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ 1=(1)^2 \\ 3 \\ 3=3 \times (1)^2 \\ 6 \\ 6 \\ 36=(6)^2 \\ 10 \\ 360=10 \times (6)^2 \\ 3 \\ 1080=3 \times 10 \times (6)^2 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10 \\ 10 \\ 100=(10)^2 \\ 3 \\ 300=3 \times (10)^2 \\ 6 \\ 1800=3 \times (10)^2 \times 6 \end{array}$ |
| $\begin{array}{r} 1 \\ 300 \overline{) 191016} \\ \underline{1800} \\ 1080 \\ \underline{216} \\ 191016 \end{array}$ |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |

Въ семь рѣшеніи должно только замѣтить, что какъ упрощенное произведеніе изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>ю</sup>, ил. е. 1 (сотня тысячъ), дѣленное на упрощенный квадратъ 1<sup>го</sup> члена, 3 (десятка тысячъ), даешь въ частномъ 0 (десятиковъ), то и должно поставить въ искомомъ кубическомъ корнѣ 0 на мѣстѣ десятиковъ.

Изъ предъидущихъ рѣшеній можно вывести слѣдующія правила для извлеченія кубическихъ корней изъ данныхъ цѣлыхъ чиселъ:

I. Поставивъ знакъ кубическаго корня надъ даннымъ числомъ, надлежитъ раздѣлить оное, начиная отъ правой руки къ лѣвой, на грани, полагая въ каждой по 3 цифры, кромѣ послѣдней, въ которой можетъ быть 1 и 2 цифры.

II. Нашедши наибольшее кубическое число, содержащееся въ первой грани, должно соотвѣтствующій оному кубическій корень поставить первымъ членомъ искомаго корня.

III. Вычестъ изъ первой грани кубъ найденнаго 1<sup>го</sup> члена.

IV. Прибавивъ къ остатку слѣдующую грань отчеркнуть отъ оной первую цифру (для утроеннаго произведенія изъ квадрата 1<sup>го</sup> члена на 2<sup>ю</sup>).

V. Число сіе раздѣлить на утроен-



ный квадратъ перваго члена — и найденное частное будетъ 2<sup>мъ</sup> членомъ искомаго корня. Если же первое число не дѣлится на второе, то ставится 0 на второмъ мѣстѣ корня.

VI. Умноживъ утроенный квадратъ 1<sup>го</sup> члена на найденный 2<sup>ый</sup> членъ, подписать полученное произведение такъ, чтобъ первая цифра онаго была подъ первую цифру снесенной грани.

VII. Потомъ надлежитъ найти утроенное произведение изъ 1<sup>го</sup> члена на квадратъ 2<sup>го</sup>, и подписать оное подъ даннымъ числомъ такъ, чтобъ первая цифра онаго находилась подъ вторую цифру снесенной грани.

VIII. Наконецъ должно подписать кубъ 2<sup>го</sup> члена такъ, чтобъ его первая цифра была подъ послѣднюю цифру снесенной грани.

IX. Сложивъ всѣ упомянутыя части, надлежитъ найденную сумму вычесть изъ остатка отъ первой грани и снесенной грани.

X. Чтобъ найти третій членъ и прочіе, должно поступать точно такъ, какъ при опредѣленіи втораго, принимая сумму предъидущихъ членовъ за одинъ членъ.

# § 149. Извлеченіе кубическихъ корней изъ дробныхъ чиселъ.

Чтобы возвысить простую дробь въ третью степень (§ 145), надлежитъ возвысить ея числителя и знаменателя въ третью степень. Изъ сего слѣдуетъ, что для извлеченія кубическаго корня должно сдѣлать обратное дѣйствіе, т. е. извлечь кубическій корень какъ изъ числителя, такъ и знаменателя, и корень перваго будешь числителемъ, а втораго знаменателемъ.

Примѣры:

$$\text{I. } \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{II. } \sqrt[3]{\frac{343}{1000}} = \frac{\sqrt[3]{343}}{\sqrt[3]{1000}} = \frac{7}{10}$$

Если же числитель или знаменатель, или оба члена дроби суть неизвлекаемые числа, то простая дробь обращается въ десятичную, и изъ послѣдней извлекается кубическій корень, какъ ниже показано.

Извлеченіе кубическихъ корней изъ десятичныхъ дробей производится совершенно по тѣмъ же правиламъ, какія были выведены для извлеченія кубическихъ корней изъ цѣлыхъ чиселъ; все

различіе заключается въ раздѣленіи на грани. Поелику первый знакъ десятичной дроби означаетъ десятыя, а кубъ десятихъ долей даетъ тысячныя; но для опредѣленія перваго десятичнаго знака искомаго корня должно опредѣлить отъ данной десятичной дроби 3 цифры. Для опредѣленія прочихъ цифръ искомаго корня, надлежитъ также сносить грани, изъ 3 цифръ состоящія, и поступать точно такъ, какъ при извлеченіи кубическихъ корней изъ цѣлыхъ чиселъ. Можетъ случиться, что для послѣдней грани останется только 1 или 2 цифры; но въ такомъ случаѣ грань дополняется нулями, основываясь на томъ, что величина десятичной дроби отъ того не измѣняется (§ 97).

Примѣръ 1. Извлечь кубическій корень изъ 0,015625.

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{0,015.625} (0,25 \\ \quad 8 \\ 12 \overline{) 7625} \\ \quad \underline{60} \\ \quad 150 \\ \quad \underline{125} \\ \quad 7625 \end{array}$$

Примѣръ 2. Извлечь кубическій корень изъ 0,5.

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{0,500} (0,7 \\ \quad \underline{343} \\ \quad 157 \end{array}$$



Здѣсь надлежитъ замѣнить, что данная десятичная дробь должна быть сперва приведена въ тысячныя доли (т. е. надобно дополнить грань): ибо кубъ десятихъ заключается въ тысячныхъ; попомъ же поступать, какъ выше показано.

Если данное число состоить изъ цѣлаго числа съ десятичною дробью, то цѣлое раздѣляется на грани отъ правой руки къ лѣвой, начиная отъ запятой, а десятичная дробь отъ лѣвой къ правой.

Примѣръ 3. Извлечь кубическій корень изъ 9,528128.

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{9,528.128} \quad (2,12. \\ \underline{8} \\ 12 \overline{)1528} \\ \underline{1261} \\ 1323 \overline{)267128} \\ \underline{2646} \\ 2528 \\ \underline{267128} \end{array}$$

§ 150. Извлечение приближенныхъ кубическихъ корней изъ неизвлекаемыхъ чиселъ.

Пусть будетъ данное число 31. Изъ таблицы въ § 147 помѣщенной, явствуетъ, что кубическій корень сего числа болѣе 3<sup>хъ</sup>, а менѣе 4. Числомъ опредѣлимъ оный корень точ-

нѣе, должно найти, сколько въ немъ, сверхъ 3 единицъ, содержицца десятыя, сотыя и ш. д. часней.

Кубъ десятиныхъ заключаеися въ тысячныхъ; посему остатокъ отъ цѣлаго числа, 4 единицы, должно привести въ тысячныя доли, и потомъ поступать какъ показано въ предъидущемъ параграфѣ.

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{31} (3,1 \\ 27 \\ \hline 27 \overline{) 4000} \\ \underline{2791} \\ 1209 \end{array}$$

И такъ въ искомомъ кубическомъ корнѣ, сверхъ 3 единицъ, содержицца еще 1 десятая. Чтобы найти, сколько сотыхъ должно быть въ корнѣ, надлежишь къ остатку прибавить еще 3 нуля, ш. е. привести въ миллионныя доли (ибо  $\frac{1}{100} \times \frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{1000000}$ ), и потомъ поступать по предъидущему.

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{31} (3,14 \\ 27 \\ \hline 24 \overline{) 4000} \\ \underline{2791} \\ 1209000 \\ \underline{11532} \\ 1488 \\ 64 \\ \hline 1168144 \\ \hline 40856 \end{array}$$

Продолжая такимъ образомъ прибавляя къ остатку по 3 нуля, можно получить въ иско-  
момъ кубическомъ корнѣ произвольное число  
десятичныхъ знаковъ, и оный будетъ тѣмъ  
болѣе приближаться къ настоящей своей ве-  
личинѣ, чѣмъ болѣе будетъ десятичныхъ  
знаковъ.



## ПРИБАВЛЕНІЕ II.

(Къ § 49.)

### I. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИНОСТРАННЫХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ МОНЕТЪ СЪ РОССІЙСКИМИ.

#### А В С Т Р І Я.

Спеціесь шалеръ. . . . . = 1,300 руб. сер.

Въ 1 спеціесь-шалерѣ 2 гульдена, а

въ 1 гульденѣ 60 крейцеровъ.

Червонецъ Имперскій . . . = 2,871 руб. зол.

Червонецъ Венгерскій или Крем-  
ницкій . . . . . = 2,881 — —

#### А Н Г Л І Я.

Крона . . . . . = 1,524 руб. сер.

Въ 1 кронѣ 5 шиллинговъ, въ 1

шиллингѣ 12 пенсовъ, а въ 1

пенсѣ 4 фаршинга.

Гиней (21 шилл) . . . . . = 6,406 руб. зол.

Соверень (20 шилл.) . . . = 6,107 — —

20 шиллинговъ составляютъ фунтъ  
стерлинга.

## В Е Н Е Ц І Я.

Талеро. . . . . = 2,167 руб. сер.

Въ 1 талеро 10 лиръ, въ 1 лирѣ  
20 солди, а въ 1 солди 20 пен-  
шимовъ.

Суверень (40 лиръ). . . . = 8,507 руб. зол.

Чекино. . . . . = 2,89 — —

## Д А Н І Я.

Долларъ (рейхсбанкъ) = 0,703 руб. сер.

Въ 1 долларѣ 3 марка, а въ 1 маркѣ  
16 шиллинговъ.

Червонецъ или дукапъ спеціесь = 2,871 руб. зол.

Христіандоръ . . . . . = 5,050 — —

## Г А М Б У Р Г Ъ.

Рейхспалеръ (банко). . . . . = 1,444 руб. сер.

Въ 1 палерѣ 3 марка, а въ 1 маркѣ  
16 шиллинговъ.

Червонецъ Имперскій . . . . = 2,860 руб. зол.

## Г О Л Л А Н Д І Я.

Ефимокъ. . . . . = 1,336. руб. сер.

Въ 1 ефимкѣ 2½ гульдена, въ 1 гуль-  
денѣ 20 шпиверовъ, въ 1 шпи-  
верѣ 4 дюйша.

Червонецъ. . . . . = 2,863 руб. зол.

## И С П А Н І Я.

Піастръ . . . . . = 1,348 руб. сер.

Въ 1 піастръ 20 реаловъ, а въ 1 реалъ 34 мараведисъ.

Писполь . . . . . = 4,938 руб. зол.

## НЕАПОЛЬ И СИЦИЛІЯ.

Дукато . . . . . = 1,063 руб. сер.

Въ 1 дукато 5 скуди, а въ 1 скудо 20 грани.

Ончешпа . . . . . = 3,145 руб. зол.

## П О Р Т У Г А Л Л І Я.

Крузадо . . . . . = 0,732 руб. сер.

Въ 1 крузадо 12 реаловъ, въ 1 реалъ 40 реесъ.

Добраонъ . . . . . = 43,47 руб. зол.

## П Р У С С І Я.

Талеръ . . . . . = 0,929 руб. сер.

Въ 1 талеръ 24 старыхъ или 30 нов. грошей, а въ 1 грошъ 12 ифениговъ.

Фридрихсд'оръ . . . . . = 5,031 руб. зол.

## Р и м ъ.

Скудо . . . . . = 1,347 руб. сер.

Въ 1 скудо 3½ шесюни, въ 1 шесюни 3 паоли.

Чекино . . . . . = 2,857 руб. зол.



## САКСОНІЯ.

Рейхсталеръ . . . . . = 0,975 руб. сер.  
 Спеціесъ-талеръ . . . . . = 1,300 — —  
 Въ 1 талерѣ 24 гроша, въ 1 гро-  
 шѣ 12 пфениговъ.

## ТУРЦІЯ.

Піастръ . . . . . = 0,100 руб. сер.  
 Въ 1 піастрѣ 40 пара.  
 Фондукъ . . . . . = 2,890 руб. зол.

## ФРАНЦІЯ.

Франкъ . . . . . = 0,250228 р. сер.  
 Въ 1 франкѣ 20 су, а въ 1 су 5 ценшимовъ.  
 Луидоръ (новый) въ 20 франковъ = 4,84313 р. з.

## ШВЕЙЦАРІЯ.

Франкъ . . . . . = 0,375 руб. сер.  
 Въ 1 франкѣ 10 бацецовъ, а въ 1  
 баценѣ 4 крейцера.  
 Луидоръ (старый) . . . . . = 6,004 руб. зол.

## ШВЕЦІЯ.

Рейхсталеръ . . . . . = 1,429 руб. сер.  
 Въ 1 талерѣ 48 шиллинговъ, а въ  
 1 шиллингѣ 12 пфениговъ.  
 Червонецъ . . . . . = 2,833 руб. зол.

*Примѣч.* Монеты, кошорыя въ сей табли-  
 цѣ сравнены съ Россійскою золошою монетою,  
 суть также золошья.

II. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГЛАВНѢЙ-  
ШИХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ЛИНЕЙНЫХЪ  
МѢРЪ СЪ РОССИЙСКИМИ.

1) Футы.

ли.

|                                                  |                |     |
|--------------------------------------------------|----------------|-----|
| Австрійскій футъ .....                           | 1 ф. 0 д. 4,45 | ли. |
| — — — — — клафтеръ (6 футовъ) 6 — 2 —            | 6,68           | —   |
| Англійскій футъ ( $\frac{1}{6}$ фатомъ) 1 ф. 0 — | 0,00           | д.  |
| — — — — — ярдъ (3 фута) 3 — 0 —                  | 0,00           | —   |
| Датскій футъ ( $\frac{1}{10}$ русе) 1 — 0 —      | 3,47           | —   |
| Испанскій футъ .....                             | 11 — 1,28      | —   |
| Неаполитанскій пальмо....                        | 10 — 3,46      | —   |
| Нидерландскій футъ .....                         | 11 — 1,44      | —   |
| Португальскій футъ .....                         | 1 — 1 — 3,30   | —   |
| Прускій или Рейнскій ф.                          |                |     |
| ( $\frac{1}{10}$ рус.) .....                     | 1 — 0 — 3,56   | —   |
| Римскій пальмо .....                             | 8 — 7,95       | —   |
| — — — — — футъ .....                             | 11 — 5,99      | —   |
| Саксонскій футъ ( $\frac{1}{6}$ клафтера) 11 —   | 1,52           | —   |
| Турецкій большой пикъ ... 2 — 2 —                | 3,41           | —   |
| — — — — — дра сѣмбуличъ 2 — 1 —                  | 5,06           | —   |
| Французскій футъ ( $\frac{1}{6}$ тоаза) 1 — 0 —  | 7,89           | —   |
| — — — — — метръ .....                            | 3 — 3 — 3,7079 | —   |
| Шведскій футъ ( $\frac{1}{10}$ русе) .....       | 11 — 6,86      | —   |

## 2) Мили.

|                           | Величина<br>въ сажен. | Сколько въ<br>1 град. экв. |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Австрійскія.....          | 3555,6                | 14,67                      |
| Англійскія (новыя).....   | 754,3                 | 69,12                      |
| (морскія).....            | 869,3                 | 60,00                      |
| Голландскія.....          | 2747,8                | 18,98                      |
| Дашскія.....              | 3530,3                | 14,77                      |
| Испанскія.....            | 3311,9                | 15,75                      |
| Италіянскія.....          | 869,3                 | 60,00                      |
| Нидерландскія (часы)..... | 2654,1                | 19,65                      |
| (морскія).....            | 2608,0                | 20,00                      |
| Нѣмецкія (новыя).....     | 2942,0                | 17,73                      |
| (географич).....          | 3477,3                | 15,00                      |
| Португальскія.....        | 2900,3                | 18,00                      |
| Прусскія.....             | 3633,3                | 14,35                      |
| Римскія.....              | 691,5                 | 75,42                      |
| Русскія (версты).....     | 500,0                 | 104,32                     |
| Саксонскія.....           | 4248,3                | 12,28                      |
| Турецкія (берри).....     | 783,0                 | 66,62                      |
| морскія.....              | 614,7                 | 84,85                      |
| Французскія.....          | 2088,3                | 24,97                      |
| морскія.....              | 2608,0                | 20,00                      |
| Шведскія.....             | 5015,1                | 10,40                      |
| Швейцарскія.....          | 3925,7                | 13,29                      |



### III. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИНО- СТРАННЫХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ВѢСОВЪ СЪ РОССИЙСКИМИ.

|                                    | Фунты<br>Россійск. | Гран. (*)<br>Англійск. |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Австрійскій торговый фунт. = 1,369 |                    | 8645                   |
| Англійскій торговый..... = 1,108   |                    | 7000                   |
| Венеціанскій тяжелый .... = 1,165  |                    | 7363                   |
| Данскій торговый ..... = 1,222     |                    | 7720                   |
| Гамбургскій порт..... = 1,184      |                    | 7476                   |
| Голландскій новый..... = 2,443     |                    | 15434                  |
| Испанскій торговый..... = 1,124    |                    | 7101                   |
| Португальскій..... = 1,121         |                    | 7083                   |
| Пруссійскій..... = 1,141           |                    | 7318                   |
| Турецкій (окъ)..... = 3,141        |                    | 19830                  |
| Французскій киллограммъ = 2,443    |                    | 15434                  |
| Шведскій викуальный... = 1,039     |                    | 6563                   |

---

(\*) Въ Россійскомъ фунтѣ 6316 Англійскихъ грановъ.

К О Н Е Ц Ъ.